

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/99/0988
Ketofen 1 % šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Merial
4 chemin du Calquet
31300 Toulouse
Francija

CEVA Santé Animale
10 Av de la Ballastière
33500 Libourne
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ketofen 1 % šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem
Ketoprofen

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur :

Aktīvā viela :

Ketoprofēns 10 mg

Palīgvielas līdz 1 ml.

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Akūtu, sāpīgu, ar iekaisuma procesu saistītu muskuļu un skeleta sistēmas slimību ārstēšanai suņiem un kaķiem: gūžas displāzija, artroze, artrīts, traumas, dislokācijas, deformācijas, skriemeļu disku sasilšanas, spondiloze, panosteīts un audu satūkums; pēcoperācijas sāpju mazināšanai; simptomātiskai drudža ārstēšanai.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem, aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām. Nelietot, ja ir aizdomas par kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu.

Nelietot dzīvniekiem, kuriem ir smagas aknu, sirds vai nieru slimības, kā rezultātā var būt nosliece uz kuņģa čūlu veidošanos. Nelietot kopā ar citiem nesteroīdajiem pretiekaisuma un diurētiskajiem līdzekļiem vai antikoagulantiem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Retos gadījumos novērotas atsevišķas gremošanas sistēmas traucējumu pazīmes (vemšana, diareja). Tās ātri izzūd pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Suņiem: subkutānai, intramuskulārai vai intravenozai lietošanai.

Kaķiem: subkutānai lietošanai.

Suņiem, kaķiem: 2 mg ketoprofēna/kg ķermeņa svara (atbilst 0,2 ml/kg ķermeņa svara) vienu reizi dienā 1 - 3 dienas pēc kārtas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Jāievēro piesardzība, lietojot smagi dehidratētiem dzīvniekiem, dzīvniekiem ar hipovolēmiju un ar pazeminātu asinsspiedienu vai dzīvniekiem, kuri jaunāki par 6 nedēļām.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Pēc nejaušas iekļūšanas acīs, skalot skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens. Mazgāt rokas pēc zāļu lietošanas.

Grūsnība un laktācija:

Laboratoriskajos pētījumos žurkām netika konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai maternotoksiska iedarbība. Tā kā nav pieejami dati par zāļu lietošanu grūsnām kucēm un kaķenēm, grūsnības laikā zāles lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar citām pretiekaisuma zālēm, diurētiskajiem līdzekļiem vai antikoagulantiem.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ketoprofēns neuzrāda nekādas blakusparādības, lietojot 2 reizes lielāku devu par ieteicamo devu un 3 reizes ilgāk par ieteicamo ārstēšanas laiku.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

07/2017

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.