

IEPAKOJUMA MARKĒJUMS – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MARKĒJUMS – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/DCP/12/0037

Zuritol 25 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

Šīm veterinārajām zālēm nav atsevišķa lietošanas instrukcija, visa lietošanas instrukcijā paredzētā informācija ir norādīta uz marķējuma

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)
Spānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Zuritol 25 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām
Toltrazuril

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Toltrazurils 25 mg/ml
Dzidrs bezkrāsains līdz brūns šķīdums.

4. INDIKĀCIJAS

Kokcidiozes ārstēšanai jaunputniem un vaislas broileriem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, kad zināma pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

7. MĒRĶA SUGAS

Vistas (jaunputni un vaislas putni)

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai (ar dzeramo ūdeni).

Ieteicamā deva ir 7 mg uz kg ķermeņa svara (atbilst 28 ml zāļu uz 100 kg ķermeņa svara vai 1,4 ml zāļu uz litru dzeramā ūdens, balstoties uz ūdens patēriņu 1 litrs uz 5 kg ķermeņa svara) vienu reizi dienā divas dienas pēc kārtas.

Šīs zāles lieto vai nu nepārtraukti dodot 48 stundas, vai kopējo devu dodot 8 stundu ilgā periodā vienā dienā divas dienas pēc kārtas.

Ārstējamo putnu kopējam svaram un diennakts ūdens patēriņam jābūt precīzi aprēķinātam.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Ūdens patēriņš atkarīgs no putnu klīniskā stāvokļa, apkārtējās vides temperatūras, apgaismojuma programmas, dzirdināšanas sistēmas, putnu vecuma un šķirnes. Ja ūdens patēriņš ir lielāks vai mazāks par augstāk minētajiem standartiem, attiecīgi piemērojama zāļu koncentrācija dzeramajā ūdenī. Izmantot piemērotas un precīzi kalibrētas dozēšanas ierīces. Zāļu šķīdumam jābūt vienīgajam dzeramā ūdens avotam.

Šķīdumu ar zālēm var lietot tikai 24 stundas, un katru dienu tas ir jāsagatavo svaigs.

Atšķaidījums lielākā koncentrācijā nekā 3:1000 (3 ml zāļu uz 1 litru dzeramā ūdens) var radīt nosēdumus. Iepriekšēja atšķaidīšana un lietošana ar dozēšanas sūkni nav ieteicama. Vēlams izmantot lielu ūdens tvertni.

Pēc ārstniecības perioda beigām ūdens padeves sistēma pienācīgi jāiztīra, lai izvairītos no aktīvās vielas uzņemšanas samazinātās devās.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 16 dienas.

Nelietot putniem, no kuriem iegūst vai no kuriem paredzēts iegūt olas lietošanai pārtikā. Nelietot 6 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma.

Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas ar dzeramo ūdeni; 24 stundas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši.

Pēc atvēršanas izlietot līdz ...

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Līdzīgi kā lietojot citus pretkokcidiālos līdzekļus, ilgstošas vienas klases preprotozoju līdzekļu lietošanas rezultātā var attīstīties rezistence.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Labas higiēnas prakses ievērošana var samazināt kokcidiālo risku. Tādēļ papildus ārstēšanai ieteicams novērst jebkuras putnu turēšanas neatbilstības. Novietnēm jābūt tīrām un sausām. Ieteicams vienlaicīgi ārstēt visus putnus grupā. Lai panāktu labākus rezultātus, ārstēšana jāsāk pirms slimība ir izplatījusies visā putnu grupā.

Šīs veterinārās zāles ir stipri sārmainas šķīdums un tās nedrīkst lietot neatšķaidītas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Šīs zāles ir sārmainas šķīdums—jāizvairās no saskares ar ādu un gļotādu. Strādājot ar šīm zālēm, jāizmanto aizsargbrilles un aizsargcimdi. Pēc nejaūšas saskares ar ādu vai iekļūšanas acīs, skarto vietu

skalot ar lielu ūdens daudzumu. Ja pēc saskares acīs vai uz ādas joprojām ir kairinājums, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt ārstam zāļu lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu. Cilvēkiem ar zināmu jutību pret toltrazurilu vai kādu no palīgvielām, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm zālēm.

Lietojot šīs veterinārās zāles neēst, nedzert un nesmēķēt.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pirmās zāļu nepanesības pazīmes, piemēram, samazināts ūdens patēriņš, tika novērotas 5 reizes pārsniedzot ieteicamo devu.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

01/2023

15. CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

Reģistrācijas numurs:

Lot:

EXP: {mēnesis/gads}

1 litrs ABPE pudele

5 litrs ABPE pudele

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.