

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/08/1568

Duelmint 40 pasta iekšķīgai lietošanai maza auguma suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (BO), Itālija.

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Duelmint 40 pasta iekšķīgai lietošanai maza auguma suņiem un kaķiem.
Mebendazolam, /Praziquantelum

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml pastas satur-

Aktīvās vielas:

Mebendazols 40 mg

Prazikvantels 2 mg

Palīgvielas: līdz 1 ml.

4. INDIKĀCIJAS

Duelmint ir indicēts suņiem un kaķiem gastrointestinālo nematožu un cestozu invāziju ārstēšanai.

Darbojas pret nematodēm:

- cērmēm (*Toxocara spp.*, *Toxascaris spp.*)
- āķtārpiem (*Ancylostoma spp.*, *Uncinaria spp.*)
- matgalvjēm (*Trichuris spp.*)

Pret cestodēm:

- lenteņiem (*Echinococcus spp.*, *Dipylidium spp.*, *Taenia spp.*, *Diphyllobothium spp.*)

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot vienlaicīgi ar fosforskābes esterus saturošiem ektoparazitāriem līdzekļiem.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Maza auguma suņi, kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Duelmint deva ir 20 mg mebendazola un 1mg prazikvantela uz kg ķermeņa svara pēc šādas shēmas:
Duelmint 40 maza auguma suņiem un kaķiem: viens 1ml pastas, kas atbilst 1 injektora iedalījumam/2 kg ķermeņa svara dienā 3 dienas pēc kārtas. Viens injektors ir pietiekošs 10 kg smaga dzīvnieka terapijas kursam.

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Zāles ir fasētas graduētos injektoros, kura 1 iedalījums atbilst 1 cc jeb 1ml. Tirdzniecības iepakojumā dozēšanas gredzens atrodas virzuļa galā. Lai precīzi noteiktu nepieciešamo pastas daudzumu, dozēšanas gredzenu rotē pulksteņrādītāja virzienā. Gredzenu bloķē tajā iedalījumā kas atbilst nepieciešamai devai, pēc tam noņem uzgalī un virza virzuli. Tālākai lietošanai gredzenu virza pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz injektors ir pilnīgi tukšs.

Pastu aplicē ar injektoru tieši dzīvnieka mutē, ieteicams uz mēles pamatnes. Pirms lietošanas nav nepieciešama dzīvnieka badināšana; pastu var izēdināt kopā ar barību.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

Uzglabāt tumšā, vēsā vietā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Cērmju invāzijas gadījumā, lai zāles iedarbotos pret cērmēm dažādās kāpuru attīstības stadijās, ieteicams ārstēšanu atkārtot ik pēc 3-4 nedēļām, līdz dzīvnieka koproloģiskās analīzes ir negatīvas.

Dipylidium caninum invāzijas gadījumā, lai novērstu reinvadēšanos, paralēli ir jāveic blusu apkarošana.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Gadījumā, ja zāles nokļūst uz ādas, to rūpīgi nomazgāt. Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Devu, kas trīskārt pārsniedz terapeitisko devu, neizraisīja nevēlamas blakusreakcijas. Iespējama vemšana saistībā ar mebendazola izraisītu intoleranci kuņģī.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

Grūsnība:

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Laktācija:

Drīkst lietot laktācijas laikā.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri: 15 ml

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Latvija