

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

BOX

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Qivitan LC 75 mg Salbe zur intramammären Anwendung

2. WIRKSTOFF(E)

1 Injektor zu 8 g enthält:

Cefquinom 75 mg
(als Cefquinomsulfat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

3 Injektoren zu 8 g
12 Injektoren zu 8 g
24 Injektoren zu 8 g
36 Injektoren zu 8 g

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (laktierende Kühen).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramammären Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: 4 Tage.
Milch: 5 Tage (120 Stunden).

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LIVISTO Int'l, S.L.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V543466

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{Injektor}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Qivitan LC 75 mg

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1 Injektor zu 8 g enthält:

Cefquinom 75 mg
(als Cefquinomsulfat)

3. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 4 Tage.

Milch: 5 Tage (120 Stunden).

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

5. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}