

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK {DOBOZ}

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Elülső oldal: ProtecTix 250 mg/1250 mg rácsepegtető oldat kutyák számára

Hátoldal: ProtecTix 250 mg/1250 mg rácsepegtető oldat 10 –25 kg közötti kutyák számára

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Tartalma 2,5 ml-es pipettánként:

250 mg imidakloprid

1250 mg permetrin

3. KISZERELÉSI EGYSÉG

1 x 2,5 ml
2 x 2,5 ml
3 x 2,5 ml
4 x 2,5 ml
6 x 2,5 ml
12 x 2,5 ml
24 x 2,5 ml

4. CÉLÁLLAT FAJOK



10 - 25 kg

5. JAVALLATOK

[A doboz elülső oldalára kerülő szöveg:]

- Elpusztítja a kullancsokat, bolhákat és szórtetveket
- Elriasztja a kullancsokat, szúnyogokat, lepkeszúnyogokat, valamint szuronyos istállólegyeket
- Mérsékli a kutya leishmaniosis és a kutya ehrlichiosis fertőzés kockázatát.

6 parazita piktogramja: kullancs, bolha, szórtetű, szúnyog, lepkeszúnyog, szuronyos istállólegy

[A doboz hátoldalára kerülő szöveg:]

- Bolhafertőzés kezelése és megelőzése, 4 hétig; alkalmazható a bolhaallergiás dermatitis kezelési stratégia részeként.
- Megszünteti a szórtetvességet.
- Elriasztja és elpusztítja a kullancsokat 3–4 hétig, a kullancsfajtól függően.
- A kezelés időpontjában a kutyán lévő kullancsok a kezelés után még két napig életben maradhatnak, láthatóak lehetnek a kutya bőrébe fúródva. Ezért javasolt a kullancsok eltávolítása a kezelés időpontjában a további vérszívás megakadályozása céljából.
- Elriasztja a lepkeszúnyogokat, szúnyogokat és szuronyos istállólegyeket 2–4 héten át.
- Mérsékli a fertőződés kockázatát legfeljebb 3 hétig a leishmaniosis, 4 hétig az ehrlichiosis esetén.

6. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Rácsepegtetés. Kizárólag külsőleg alkalmazható!

Egy pipetta egy kutya kezeléséhez használható.



Megőrzi hatékonyságát akkor is, ha a szőrzet nedves lesz. A kezelt kutyák közvetlen környezetében a bolhalárvákkal szemben ölő hatást biztosít. Ne alkalmazza 7 hetesnél, illetve 10 kg-nál kisebb kutyákon! Vemhesség, illetve laktáció esetén kizárólag az állatorvos tanácsa szerint alkalmazható.

7. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

8. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Hűtőben vagy fagyasztóban nem tárolható.

Az eredeti csomagolásban tárolandó a fénytől és a nedvességtől való megóvás érdekében.

10. „ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!” SZAVAK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

11. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.



12. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

13. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

beaphar[®]

14. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMAI

4419/1/23 NÉBIH ÁTI (1 pipetta)
4419/2/23 NÉBIH ÁTI (2 pipetta)
4419/3/23 NÉBIH ÁTI (3 pipetta)
4419/4/23 NÉBIH ÁTI (4 pipetta)
4419/5/23 NÉBIH ÁTI (6 pipetta)
4419/6/23 NÉBIH ÁTI (12 pipetta)
4419/7/23 NÉBIH ÁTI (24 pipetta)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

{Tasak}

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

ProtecTix

**2. A HATÓANYAGOK MENNYISÉGI ADATAI**

250 mg Imidacloprid(e)

1250 mg Permethrin(e)

2,5 ml

3. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

4. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

*A pipettát a felbontás után azonnal fel kell használni!***beaphar®**

**A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN
FELTÜNTETENDŐ ADATOK**

{Pipetta}

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

ProtecTix

**2. A HATÓANYAGOK MENNYISÉGI ADATAI**

250 mg Imidacloprid(e)

1250 mg Permethrin(e)

2,5 ml

3. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

4. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

beaphar®