

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PGF Veyx 0,0875 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält 0,0875 mg Cloprostenol (entsprechend 0,092 mg Cloprostenol-Natrium).

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml

20 ml

50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh und Färse), Schwein (Sau).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Milch: Null Stunden.

Schweine:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.
Vor Licht schützen.
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Veyx-Pharma GmbH

14. ZULASSUNGSNR.

DE: Zul.-Nr. 401538.00.00

AT: Z.Nr.: 8-01093

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Durchstechflasche, 10 ml, 20 ml und 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PGF Veyx

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1 ml Lösung enthält: 0,0875 mg Cloprostenol

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____