

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla z 12 intramamarnimi injektorji po 9 g

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

VETRAMYCIN DC intramamarno mazilo za krave v presušitvi

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 injektor po 9 g intramamarnega mazila za krave Vetramycin DC vsebuje:

Prokainjev benzilpenicilinat	1,000.000 IU
Dihidroestreptomicinjev sulfat (za uporabo v veterinarski medicini)	1,000.000 IU
Vitamin A	10.000 IU
Kalcijev pantetonat	100 mg

Pomožne snovi

Butilhidroksitoluen
Aluminjev monostearat
Beli vazelin
Parafin tekoči

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarno mazilo

4. VELIKOST PAKIRANJA

Škatla z 12 intramamarnimi injektorji po 9 g

5. CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Krave v presušitvi

6. INDIKACIJA(E)

Presušitev krav z bakterijsko okužbo vimena ali brez okužbe vimena. Zdravljenje akutnega in kroničnega mastitisa v obdobju presušitve.

7. NAČIN IN POT UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Za intramamarno dajanje. Pred uporabo je treba vime povsem izmolzti, očistiti, osušiti in razkužiti.

Presušitev: 1 injektor za eno četrt vimena po zadnji molži. Zdraviti je treba vse četrti vimena sočasno.

Akutni in kronični mastitis v času presušitve: 1 injektor za eno četrt vimena po zadnji molži. Zdraviti je treba vse četrti vimena. Zaradi podaljšanega delovanja uporabite samo enkrat.

8. KARENCA

Krave: meso in notranji organi: 28 dni

mleko: 5 dni od začetka laktacije, če smo Vetramycin DC dali 35 ali več dni pred telitvijo.

40 dni od intramamarnega dajanja, če smo Vetramycin DC dali manj kot 35 dni pred telitvijo.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pri osebah, preobčutljivih za penicilin in streptomycin, se lahko pojavijo alergične reakcije na koži, zato si je treba po dajanju temeljito umiti roke ali med njim nositi rokavice.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti je 3 leta.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti (EXP), navedenega na zunanji ovojnini in injektorju. Rok uporabnosti je 3 leta.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

V.M.D.n.v., Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk, Belgium

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0314/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Lot{številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**
Intramamarni injektor

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

VETRAMYCIN DC intramamarno mazilo za krave v presušitvi

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

1 intramamarni injektor po 9 g mazila za krave v presušitvi Vetramycin DC vsebuje:

Prokainijev benzilpenicilat	1,000.000 IU
Dihidrostreptomicinijev sulfat	1,000.000 IU
(za uporabo v veterinarski medicini)	
Vitamin A	10.000 IU
Kalcijev pantetonat	100 mg

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

9 g

4. POT (I) UPORABE ZDRAVILA

Za intramamarno dajanje.

5. KARENCA

Krave: meso in notranji organi: 28 dni
mleko: 5 dni od začetka laktacije, če smo Vetramycin DC dali 35 ali več dni pred telitvijo.
40 dni od intramamarnega dajanja, če smo Vetramycin DC dali manj kot 35 dni pred telitvijo.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
Rok uporabnosti je 2 leti.

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.