

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

AviPro THYMOVAC, liofilizatas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniu

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje dozėje yra:

Veikliosios medžiagos:

Gyvų Cux-1 padermės vištų anemijos virusų: $10^{4,5}$ – $10^{5,5}$ TCID₅₀ *.

*TCID₅₀ – 50 % audinių kultūros užkrečianti dozė – viruso titras, užkrečiantis 50 % ląstelių kultūros.

Pagalbinės medžiagos:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Dinatrio fosfato dihidratas
Laktozės monohidratas
Kalio divandenilio fosfatas
Nugriebto pieno milteliai

Išvaizda: nuo raudonos iki rudos spalvos liofilizatas.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos.

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Veislinėms vištoms, nuo 8 sav. amžiaus, aktyviai imunizuoti, norint apsaugoti nuo vištų infekcinės anemijos viruso išskyrimo ir perdavimo kiaušiniams.

Imuniteto pradžia: 4 sav. po vakcinacijos

Imuniteto trukmė: 43 sav. po vakcinacijos, įrodyta bandymais.

Pasyviai palikuonių apsaugai nuo klinikinių vištų infekcinės anemijos simptomų bei pažeidimų.

Palikuonių apsauga garantuojama 51 sav. po veislinių vištų vakcinacijos. Apsauga užtikrinama 1 d. amžiaus viščiukams (įrodyta bandymais).

3.3. Kontraindikacijos

Nėra.

3.4. Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Vakcinuoti galima vištas nuo 8 sav. amžiaus, bet ne vėliau kaip likus 6 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios, siekiant, kad imunitetas susiformuotų iki to laiko.

Vakcinos padermės gali išplisti ir nevakcinuotoms vištoms, nes vakcinuoti viščiukai gali išskirti vakcinos padermę su išmatomis mažiausiai 14 dienų po vakcinacijos. Kadangi virusas gali sukelti klinikinius simptomus labai jauniems jaunikliams, reikia vengti pernešimo į neapsaugotus paukščius. Reikia imtis ypatingų atsargumo priemonių, kad vakcinos padermė nepaplistų vištoms dedeklėms, paukščiams prieš kiaušinių dėjimą ir jaunesniems nei 3 savaitių amžiaus paukščiams. Vakcinos negalima naudoti, kai kartu laikomi skirtingų amžiaus grupių paukščiai.

Reikia vengti streso prieš vakcinaciją, vakcinacijos metu ir po jos.

Vakcininės padermės virusai gali būti randami įvairiuose organuose ir audiniuose nuo 7 iki 49 dienų po vakcinacijos.

Norint sumažinti infekcijos poveikį prieš susidarant imunitetui, kraikas ir paukštėdės prieš kiekvieną auginimo ciklą turi būti išvalyti.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Vakcinos sudėtyje yra gyvų virusų, todėl naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės mūvėti pirštines, saugoti akis, dezinfekuoti ir nusiplauti rankas, kad būtų išvengta bet kokio užkrėtimo, pvz., purškiant ar pilant.

Tvarkant naminių paukščių išmatas, būtina laikytis atsargumo priemonių, nes vakcininis virusas gali būti išskiriamas su išmatomis iki 14 d.

Po vakcinacijos būtina plauti ir dezinfekuoti rankas ir įrangą.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujamos reakcijos

Vištos

Nežinomos.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Dedantys kiaušinius paukščiai

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu ir 6 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Ištirpinus reikia girdyti vištoms su geriamuoju vandeniu.

Vieną vakcinos dozę skirti vienam paukščiui.

Dozės ir naudojimas:

Naudojimas su geriamuoju vandeniu:

- Pirmiausia reikia nustatyti vakcinos dozių skaičių ir reikiamą vandens kiekį (žr. žemiau). Negalima perskirti didelio kiekio vakcinos, norint vakcinuoti daugiau nei vieno pastato arba girdymo sistemos paukščius, nes tai gali sukelti maišymo klaidas.
 - Reikia įsitikinti, kad visos priemonės naudojamos vakcinacijai (vamzdeliai, vamzdynai, girdyklos ir t.t.) yra visiškai švarūs, be dezinfekantų ir detergentų liekanų.
 - Naudoti būtina tik šaltą ir šviežią vandenį, pageidautina nechloruotą ir be metalų jonų.
 - Vandens kokybei pagerinti ir vakcinos stabilumui padidinti į vandenį galima įmaišyti lieso (<1 % riebumo) pieno (2–4 g/l vandens) arba nugriebto pieno (20–40 ml/l vandens) miltelių. Tai reikia daryti likus ne daugiau kaip 10 min. iki vakcinos tirpinimo.
 - Vakcinos buteliuką reikia atkimšti po vandeniu ir kruopščiai ištirpinti vakciną. Po to buteliuką ir kamštelį reikia praplauti vandeniu.
 - Prieš imant tiekti vakcinos tirpalą reikia įsitikinti, kad girdyklose likęs tik labai nedidelis švaraus vandens kiekis. Priešingu atveju būtina girdyklas ištuštinti.
 - Atskiesta vakcina turi būti išgerta per 2 val. Paukščių gėrimo įpročiai skiriasi, todėl prieš vakcinaciją rekomenduotina neduoti tam tikrą laiką vandens, kad visi paukščiai gertų vandenį su vakcina.
 - Geriausia, kai vakcina ištirpinama tokia vandens kiekyje, kuri paukščiai išgeria per 2 val. Atskiestą vakciną reikia išmaišyti šaltame šviežiam vandenyje (1 000 dozių vakcinos 20–40 l vandens 1 000 viščiukų). Dieną iki vakcinavimo patartina nustatyti, kokį kiekį vandens paukščiai išgeria.
 - Atskiestą vakciną būtina sunaudoti nedelsiant.
 - Reikia įsitikinti, kad vakcinacijos metu paukščiai neturėtų priėjimo prie švaraus vandens.
- Būtina laikytis vakcinacijos tikslaus naudojimo nuorodų, kad visi paukščiai gautų tikslią vakcinos dozę. Nepakankama vakcinacija gali lemti sumažėjusį efektyvumą.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Dozę viršijus 10 kartų, nepalankių reakcijų nepastebėta.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

0 parų.

4. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas: QI01AD04

Vakcina skirta veislinėms vištoms aktyviai imunizuoti bei sukelti pasyvų imunitetą jų palikuonims.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokių kitų veterinarinių vaistų.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
Tinkamumo laikas, ištirpinus pagal nurodymus, – 2 val.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C). Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Negalima sušaldyti. Atskiestą vakciną laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Negalima sušaldyti.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

I tipo stiklo buteliukai po 500, 1 000, 2 500, 5 000 ir 10 000 dozių, užkimšti I tipo gumos kamšteliais ir apgaubti nuplėšiamais aliumininiais gaubteliais, kartoninėse dėžutėse po 1 ar 10 vnt.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Lohmann Animal Health GmbH

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1217/001-010

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2009-04-29

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2024-06-26.

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

AviPro THYMOVAC.
Liofilizatas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniu

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje dozėje yra gyvų Cux-1 padermės vištų anemijos virusų $10^{4,5}$ - $10^{5,5}$ TCID₅₀

3. PAKUOTĖS DYDIS

500 / 1000 / 2500 / 5000 / 10 000 dozių
10 x 500 / 10 x 1000 / 10 x 2500 / 10 x 5000 / 10 x 10000 dozių

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vištos

5. INDIKACIJA (-OS)

6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudojant geriamąjį vandenį.

7. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}
Atskiedus sunaudoti iki 2 val.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti ir gabenti šaltai. (2–8 °C). Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Negalima sušaldyti.
Atskiestą vakciną laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Negalima sušaldyti.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“
--

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Lohmann Animal Health GmbH

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1217/001
LT/2/09/1217/002
LT/2/09/1217/003
LT/2/09/1217/004
LT/2/09/1217/005
LT/2/09/1217/006
LT/2/09/1217/007
LT/2/09/1217/008
LT/2/09/1217/009
LT/2/09/1217/010

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ BUTELIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
--

AviPro THYMOVAC

2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJA
--

500 / 1 000 / 2 500 / 5 000 / 10 000 dozių gyvų CAV Cux-1

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

AviPro THYMOVAC, liofilizatas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniu

2. Sudėtis

Vienoje dozėje yra:

Veikliosios medžiagos:

Gyvų Cux-1 padermės vištų anemijos virusų $10^{4,5}$ – $10^{5,5}$ TCID₅₀ *.

*TCID₅₀ – 50 % audinių kultūros užkrečianti dozė – viruso titras, užkrečiantis 50 % ląstelių kultūros.

Išvaizda: nuo raudonos iki rudos spalvos liofilizatas.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos

4. Naudojimo indikacijos

Veislinėms vištoms, nuo 8 sav. amžiaus, aktyviai imunizuoti, norint apsaugoti nuo vištų infekcinės anemijos viruso išskyrimo ir perdavimo kiaušiniams.

Imuniteto pradžia: 4 sav. po vakcinacijos.

Imuniteto trukmė: 43 sav. po vakcinacijos, įrodyta bandymais.

Pasyviai palikuonių apsaugai nuo klinikinių vištų infekcinės anemijos simptomų bei pažeidimų.

Palikuonių apsauga garantuojama 51 sav. po veislinių vištų vakcinacijos. Apsauga užtikrinama 1 d. amžiaus viščiukams (įrodyta bandymais).

5. Kontraindikacijos

Nėra

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams
Vakcinuoti galima vištas nuo 8 sav. amžiaus, bet ne vėliau kaip likus 6 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios, siekiant, kad imunitetas susiformuotų iki to laiko.

Vakcinos padermės gali išplisti ir nevakcinuotoms vištoms, nes vakcinuoti viščiukai gali išskirti vakcinos padermę su išmatomis mažiausiai 14 dienų po vakcinacijos. Kadangi virusas gali sukelti klinikinius simptomus labai jauniems jaunikliams, reikia vengti pernešimo į neapsaugotus paukščius. Reikia imtis ypatingų atsargumo priemonių, kad vakcinos padermė nepaplistų vištoms dedeklėms, paukščiams prieš kiaušinių dėjimą ir jaunesniems nei 3 savaičių amžiaus paukščiams. Vakcinos negalima naudoti, kai kartu laikomi skirtingų amžiaus grupių paukščiai.

Reikia vengti streso prieš vakcinaciją, vakcinacijos metu ir po jos.

Vakcininės padermės virusai gali būti randami įvairiuose organuose ir audiniuose nuo 7 iki 49 dienų po vakcinacijos.

Norint sumažinti infekcijos poveikį prieš susidarant imunitetui, kraikas ir paukštėdės prieš kiekvieną auginimo ciklą turi būti išvalyti.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Vakcinos sudėtyje yra gyvų virusų, todėl naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės, kad būtų išvengta bet kokio užkrėtimo, pvz., purškiant ar pilant.

Tvarkant naminių paukščių išmatas, būtina laikytis atsargumo priemonių, nes vakcininis virusas gali būti išskiriamas su išmatomis iki 14 d.

Po vakcinacijos būtina plauti ir dezinfekuoti rankas ir įrangą.

Dedantys kiaušinius paukščiai

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu ir 6 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu.

Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Perdozavimas

Dozę viršijus 10 kartų, nepalankių reakcijų nepastebėta.

Pagrindiniai nesuderinamumai:

Negalima maišyti su jokių kitų veterinariniu vaistu.

7. Nepageidaujamos reakcijos

Vištos

Nežinomos.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą.

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

www.vmyt.lt

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Ištirpinus reikia girdyti vištoms su geriamuoju vandeniu.

Vieną vakcinos dozę skirti vienam paukščiui.

Dozės ir naudojimas:

Naudojimas su geriamuoju vandeniu:

- Pirmiausia reikia nustatyti vakcinos dozių skaičių ir reikiamą vandens kiekį (žr. žemiau). Negalima perskirti didelio kiekio vakcinos, norint vakcinuoti daugiau nei vieno pastato arba girdymo sistemos paukščius, nes tai gali sukelti maišymo klaidas.
- Reikia įsitikinti, kad visos priemonės naudojamos vakcinacijai (vamzdeliai, vamzdynai, girdyklos ir t.t.) yra visiškai švarūs, be dezinfekantų ir detergentų liekanų.
- Naudoti būtina tik šaltą ir šviežią vandenį, pageidautina nechloruotą ir be metalų jonų.
- Vandens kokybei pagerinti ir vakcinos stabilumui padidinti į vandenį galima įmaišyti lieso (<1 % riebumo) pieno (2–4 g/l vandens) arba nugriebto pieno (20–40 ml/l vandens) miltelių. Tai reikia daryti likus ne daugiau kaip 10 min. iki vakcinos tirpinimo.
- Vakcinos buteliuką reikia atkimšti po vandeniu ir kruopščiai ištirpinti vakciną. Po to buteliuką ir kamštelį reikia praplauti vandeniu.
- Prieš imant tiekti vakcinos tirpalą reikia įsitikinti, kad girdyklose likęs tik labai nedidelis švaraus vandens kiekis. Priešingu atveju būtina girdyklas ištuštinti.

- Atskiesta vakcina turi būti išgerta per 2 val. Paukščių gėrimo įpročiai skiriasi, todėl prieš vakcinaciją rekomenduotina neduoti tam tikrą laiką vandens, kad visi paukščiai gertų vandenį su vakcina.
 - Geriausia, kai vakcina ištirpinama tokiam vandens kiekyje, kurį paukščiai išgeria per 2 val. Atskiestą vakciną reikia išmaišyti šaltame šviežiame vandenyje (1 000 dozių vakcinos 20-40 l vandens 1 000 viščiukų). Dieną iki vakcinavimo patartina nustatyti, kokį kiekį vandens paukščiai išgeria.
 - Atskiestą vakciną būtina sunaudoti nedelsiant.
 - Reikia įsitikinti, kad vakcinacijos metu paukščiai neturėtų priėjimo prie švaraus vandens.
- Būtina laikytis vakcinacijos tikslaus naudojimo nuorodų, kad visi paukščiai gautų tikslią vakcinos dozę. Nepakankama vakcinacija gali lemti sumažėjusį efektyvumą.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Negalima naudoti dedantiems kiaušinius paukščiams ir ne vėliau kaip 6 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

10. Išlauka

0 parų.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C). Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Negalima sušaldyti. Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po Exp. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, ištirpinus pagal nurodymus, – 2 val.

Atskiestą vakciną laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Negalima sušaldyti.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

I tipo stiklo buteliukai po 500, 1 000, 2 500, 5 000 ir 10 000 dozių, užkimšti I tipo gumos kamšteliais ir apgaubti nuplėšiamais aliumininiais gaubteliais, kartoninėse dėžutėse po 1 ar 10 vnt.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2024-06-26

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamą nepageidaujamą reakciją:

Lohmann Animal Health GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Vokietija
PV.LTU@elancoah.com
+3728840391

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Lohmann Animal Health GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Vokietija

17. Kita informacija

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Veislinių pulkų vakcinacija sukelia imunitetą vištų infekcinės anemijos virusui. Tai apsaugo nuo viruso išskyrimo, perduodant jį vertikaliai kiaušiniams ir horizontaliai perduodant per išmatas.

Veislinės vištos yra vakcinuojamos tokio amžiaus, kai vištų infekcinės anemijos virusas jau nebesukelia klinikinių simptomų. Vakcinacijos tikslas – perduoti motininis antikūnius palikuonims, norint apsaugoti juos nuo infekcijos tarp inkubacinio periodo ir jų pačių atsparumo formavimosi vištų infekcinei anemijai laikotarpiu.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.