

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Duowin Contact, täpilahus koertele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks 2 ml pipett sisaldab:

Toimeained:

Permetriini 800 mg

Püriproksüfeeni 6 mg

Abiained:

Butüülhüdrosütolueen 0,2 mg

Butüülhüdrosüanisool 0,4 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM

Täpilahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Koer

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Kirpude ja puukide tõrje koertel.

Kirbutõrje: Täiskasvanud kirpude hävitamine ja uue nakatumise takistamine 4 nädala jooksul.

Munade hävimise tõttu on kirpude paljunemine takistatud 8 nädala jooksul.

Puugitõrje: Puukide hävitamine ja uue nakatumise vältimine 4 nädala jooksul.

4.3. Vastunäidustused

Mitte manustada kassidele.

Mitte manustada alla 2 kuu vanustele kutsikatele.

Mitte manustada alla 2 kg kaaluvatele koertele.

Mitte manustada haigetele või haigusest paranevatele koertele.

Mitte manustada ulatuslike nahakahjustustega loomadele.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Preparaadi mõju võib väheneda, kui loom end pärast preparaadi pealekandmist kohe märjaks teeb või kui teda vahetult pärast ravi pestakse.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Ravimi käsitlemise ajal on soovitatav kasutada majapidamiskindaid.

Ravimi käsitlemise ajal mitte juua ega süüa.

Vältida preparaadi sattumist inimese nahale ja silmadesse. Kokkupuute korral loputada koheselt veega.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Harvadel juhtudel on ravitud loomadel esinenud nahasügelust, süljevoolust või oksendamist. Need nähud on taandunud iseenesest. Kui preparaat satub niiskele karvkattele, võib karv ajutiselt heledamaks värvuda või preparaadi pealekandmisjoon mõnda aega nähtavaks jääda.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Uuringud laborloomadel (hiired, rotid, küülikud) ei ole tõestanud teratogeenset või embrüotoksilist toimet.

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooniperioodil ei piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole soovitatav manustada ravimit tiinetele ja lakteerivatele loomadele.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

Nahale manustamiseks.

Soovituslik minimaalne doos 106 mg permetriini ja 0,8 mg püriproksüfeeni kg kehamassi kohta, mis vastab järgmistele preparaadi kogustele:

väikesed koerad kehamassiga kuni 7,5 kg: üks 2 ml pipett

Avada pipett vahetult enne preparaadi nahale kandmist.

Hoida pipett otse. Eemaldada kork, seda enda poole keerates.

Kanda pipeti sisu mööda selgroojoont koera nahale. Vajutada pipetile keskmise ja püsiva survega.

Kui pipetti jääb veel veidi lahust, kanda see sabajuurele ning abaluude vahele.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Koerad on hästi talunud viiekordset üleannustamist. Üleannustamise tunnused on: liigtundlikkus, liigutuste koordineerimatus, naha punetus, lihasvärinad. Esmaabi: koer pesta korduvalt ja põhjalikult.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: ektoparasiitsiidid paikseks kasutamiseks, permetriini kombinatsioonid.
ATCvet kood: QP53AC82

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Permetriin on sünteetiline püretroid, mis häirib välisparasiitide närvirakkude rakumembraani Na-K pumba tööd. Permetriin pidurdab rakumembraani aktsioonipotentsiaali ajal Na⁺ ionide sisenemist närvirakku, mille tulemusena pidurdub närviimpulsside ülekanne ja tekib parasiitide paralüüs. Püriproksüfeen pärsib välisparasiitide paljunemist takistades munade ja larvide arengut ning hoiab ära uute täiskasvanud isendite tekke. Püriproksüfeen hävitab kirbumunad.

5.2. Farmakokineetilised andmed

Ravim on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks.

Keskkonnaomadused

Duowin Contact ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Butüülhüdrosüanisool
Butüülhüdrosütolueen
Dietüleenglükoolmonoetüüleeter

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Läbipaistmatu valge üheannuseline suure tihedusega polüetüleenist pipett.

Pakend:

2 ml 4 tk pakendis.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Duowin Contact ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Virbac S.A.
1ère avenue-L.I.D.-2065 m
06516 Carros
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1402

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 05.05.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 20.04.2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Jaanuar 2022

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: käsimüügiravim.