

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI EMDICINI

Kenocidin Spray and Dip

Klorheksidinijev diglukonat 5 mg/ml, kopel za seske/pršilo za seske, raztopina za govedo (krave molznice)

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Klorheksidinijev diglukonat: 5 mg/ml (enakovreden klorheksidinu 2,815 mg/ml)

Briljantno modro FCF (E133) 0,035 mg/ml

Glicerol 60 mg/ml

Alantoin 1 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Kopel za seske/pršilo za seske, raztopina

Modra tekoča raztopina

4. VELIKOST PAKIRANJA

1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L. Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave molznice)

6. INDIKACIJE

Razkuževanje seskov kot del programa za preprečevanje mastitisa pri kravah molznicah v obdobju laktacije.

Za vzdrževanje dobrega stanja kože seska in konice seska.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Za seske.

Zdravilo je pripravljeno za uporabo kot kopel ali pršilo za seske po molži, uporablja se do dvakrat dnevno.

Uporabite vsaj 5 ml na kravo na uporabo.

Pomočite seske vseh krav takoj po molži. Zagotovite, da so seski popolnoma prekriti do treh četrtin dolžine. Lahko tudi popršite celotno površino vsakega seska takoj po molži.

Lonček za razkuževanje ali razpršilec morata biti po potrebi ponovno napolnjena.

Če uporabljate skupen lonček ali razpršilec za razkuževanje vimena morate za vsako molžo uporabiti svežo raztopino. Lonček ali razpršilec morata biti izpraznjena, očiščena in oprana po vsaki molži in med molžo, če pride do kontaminacije. Ne zlivajte preostale raztopine iz lončka ali razpršilca nazaj v originalno embalažo. Ne uporabljajte zdravila za čiščenje in sanitiranje opreme za molžo.

8. KARENCA

Meso in organi: nič dni.

Mleko: nič ur.

9. POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Zagotovite, da so vime in seski čisti in suhi pred naslednjo molžo.

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.

Klorheksidin je lahko inaktiviran z anioniskimi in neionskimi površinsko aktivnimi snovmi (npr. mili, tudi naravnimi) ali z anorganskimi anioni, zato zdravila ne mešajte z vodo, drugimi kemikalijami, razkužili in drugimi proizvodi za nego vimena in seskov.

To zdravilo se uporablja za seske, do pomembne absorpcije ne pride.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Če se pojavijo znaki bolezni ali ti znaki ne popustijo, pokličite veterinarja.

Samo za zunanjo uporabo.

Zdravilo naj se posuši preden so krave izpostavljene vlagi (dež), mrazu ali vetru.

Če so temperature pod zmrziščem, naj se seski posušijo preden krave spustimo na prosto.

Uporaba za zdravljenje seskov s kožnimi poškodbami lahko podaljša proces zdravljenja rane.

Priporoča se prekinitev uporabe dokler rane niso zaceljene. Prisotnost organskih snovi (gnoj, kri, itd ...) lahko omeji aktivnost razkužila klorheksidina.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Izogibajte se stiku z očmi. Če pride v stik z očmi, sperite s čisto tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom.

V primeru nenamernega zaužitja, popijte velike količine vode in se takoj posvetujte z zdravnikom.

Hranite ločeno od hrane in krmil.

Po uporabi si umijte roke.

Ko se zdravilo uporablja kot pršilo, se izogibajte delu v razpršeni meglici.

Osebe z znano preobčutljivostjo na klorheksidin naj se izogibajo stiku z zdravilom.

Neželeni učinki

Sprememba aktivne substance v kopeli za seske lahko v zelo redkih primerih povzroči iritacijo kože.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

Kontraindikacije

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na klorheksidin ali na katero koli pomožno snov.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 6 mesecev

Zdravilo uporabite do: _/_/_

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vsebnik shranjujte tesno zaprt.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Če je zdravilo zmrznilo, ga odtajajte v toplem prostoru in ga pred uporabo dobro pretresite.

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na obojnini.

200-litrski večodmerni vsebnik se ne sme uporabiti za ponovno polnjenje.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

NEVARNO ZA RIBE IN VODNE ORGANIZME. Z zdravilom ali praznim vsebnikom ne onesnažujte ribnikov, vodotokov ali jarkov.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIV ALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Brez Rp-vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

Belgija

Tel. +32 (0) 57 21 7877

Fax. +32 (0) 57 21 78 79

Mail: info@cidlines.com

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

MR/V/0378/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot