

ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА

А.ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Стъклено шише от 25 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

КЕТАМИН 10%, 100 mg/ml **КЕТАМИН 10 %**

Разтвор за инжектиране за кучета и котки

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

1 ml разтвор съдържа:

Ketamine hydrochloride 115.34 mg

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор

4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

10 ml, 25 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета , котки

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

имобилизиращо средство за ветеринарната хирургия

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прочети листовката преди употреба!

8. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Прочети листовката преди употреба!

10. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

След отваряне годност 7 дни

11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25°C. Да се предпазва от светлина

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него ако има такива , трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба!

Да се отпуска само с рецепта!

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

15. ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ:

BREMER PHARMA GmbH

Werkstrasse 42, 34414 Warburg

Germany.

Тел.: 0049 5642 98090

Факс: 0049 5642 980912

Email: contact@bremer-pharma.de

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

BREMER PHARMA GmbH Production

34414 Warburg

Germany

tel. 0049 5642 98090

fax: 0049 5642 980912

E mail: contact@bremer-pharma.de

16. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-1115

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия 10 X 25 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

КЕТАМИН 10% КЕТАМИН 10 %

Разтвор за инжектиране на кучета и котки

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

1 ml разтвор съдържа:

Ketamine hydrochloride 115.34 mg

(еквивалентен на ketamine 100.0 mg)

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор

4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

25 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

куче, котка

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

имобилизиращо средство за ветеринарната хирургия

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прочети листовката преди употреба!

8. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Няма

10. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25°C

Да се предпазва от светлина

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него ако има такива , трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба!

Да се отпуска само с рецепта!

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

15. ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ:

BREMER PHARMA GmbH

Werkstrasse 42, 34414 Warburg

Germany.

Тел.: 0049 5642 98090

Факс: 0049 5642 980912

Email: contact@bremer-pharma.de

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

BREMER PHARMA GmbH Production

34414 Warburg

Germany

tel. 0049 5642 98090

fax: 0049 5642 980912

E mail: contact@bremer-pharma.de

16. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Номер на лиценза за употреба: 0022-1115/17.02.2009

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Стъклено шише от 10 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

КЕТАМИН 10 %

Разтвор за инжектиране

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

1 ml разтвор съдържа:

Ketamine hydrochloride 115.34 mg

(еквивалентен на ketamine 100.0 mg)

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор

4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

10 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

кучета, котки

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

имобилизиращо средство за ветеринарната хирургия

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прочети листовката преди употреба!

8. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Няма

10. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25°C

Да се предпазва от светлина

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него ако има такива , трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба!

Да се отпуска само с рецепта!

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

15. ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ:

BREMER PHARMA GmbH

Werkstrasse 42, 34414 Warburg

Germany.

Тел.: 0049 5642 98090

Факс: 0049 5642 980912

Email: contact@bremer-pharma.de

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

BREMER PHARMA GmbH Production

34414 Warburg

Germany

tel. 0049 5642 98090

fax: 0049 5642 980912

E mail: contact@bremer-pharma.de

16. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-1115

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия 5 X 10 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

КЕТАМИН 10 %

Разтвор за инжектиране

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

1 ml разтвор съдържа:

Ketamine hydrochloride 115.4 mg

(еквивалентен на ketamine 100.0 mg)

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор

4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

10 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

кучета, котки

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

имобилизиращо средство за ветеринарната хирургия

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прочети листовката преди употреба!

8. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Няма

10. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25°C

Да се предпазва от светлина

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него ако има такива , трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба!

Да се отпуска само с рецепта!

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

15. ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ:

BREMER PHARMA GmbH

Werkstrasse 42, 34414 Warburg

Germany.

Тел.: 0049 5642 98090

Факс: 0049 5642 980912

Email: contact@bremer-pharma.de

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

BREMER PHARMA GmbH Production

34414 Warburg

Germany

tel. 0049 5642 98090

fax: 0049 5642 980912

E mail: contact@bremer-pharma.de

16. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-1115

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №:

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

В. ЛИСТОВКА

Кетамин 10%

Разтвор за инжектиране

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ /ИТЕ/ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ /ИИ/ И ПРИТЕЖАТЕЛЯТ /ИТЕ/ НА ЛИЦЕНЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИТЕ ЗА ПРОДАЖБА

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА:

BREMER PHARMA GmbH

Werkstrasse 42, 34414 Warburg

Germany.

Тел.: 0049 5642 98090

Факс: 0049 5642 980912

Email: contact@bremer-pharma.de

ЛИЦЕ ОТГОВОРНО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА:

Доц.д-р ЯНЧО ТОДОРОВ, DVM, PhD

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

BREMER PHARMA GmbH Production

34414 Warburg

Germany

tel. 0049 5642 98090

fax: 0049 5642 980912

E mail: contact@bremer-pharma.de

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

КЕТАМИН 10 %

КЕТАМИН 10%

Разтвор за инжектиране

3. АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ И ДРУГИ СЪСТАВКИ:

1 ml Ketamin 10% съдържа:

Активна субстанция:

Ketamine hydrochloride - 115.34 mg,
(еквивалентен на ketamine - 100.00 mg)

Експципиенти:

Benzethonium chloride 0.10 mg

Дестилирана вода за инжекции до 1.00 ml

4. ПОКАЗАНИЯ

Краткосрочна анестезия за диагностициране, леки хирургически процедури или

болезнени манипулации:

- почистване и вадене на зъби,
- отстраняване на чужди тела,
- инцизия на абсцеси,
- интервенции в устната кухина, лицето и ушите,
- обработка и тоалет на рани,
- смяна на превръзки,
- рентгенография,
- седиране на неспокойни, възбудени или агресивни животни,
- пункции,
- рязане на нокти, подстригване.

За генерална анестезия и аналгезия със загуба на съзнание в хирургията, при луксации, ампутации, кастрации, стерилизации, оваректомии, хистеректомии, цезарово сечение, лапаротомия, ортопедични операции. При много болезнени и продължителни операции и за поддържане на достатъчна анестезия е необходима комбинация с xylazine или други инжективни или инхалационни анестетици. За краткосрочна анестезия при кучета, кетамин трябва да се комбинира със седативни средства инжективни или инхалационни анестетици.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се прилага при животни с декомпенсирана сърдечна недостатъчност, хипертензия, заболявания на черния дроб и бъбреците, еклампсия и прееклампсия, глаукома, епилепсия, черепно-мозъчни травми, миелография и като моноанестетик при кучета. Да не се прилага при хирургични манипулации на горните дихателни пътища без комбиниране с мускулен релаксант (интубирането е задължително). Да не се прилага при животни предназначени за консумация от човек.

6. СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

В зависимост от дозата се наблюдава потискане на респираторната дейност, която особено при котките може да доведе до апнея. Комбинирането с други препарати, съдържащи потискащи респираторната дейност субстанции (напр. xylazine) усилва респираторната депресия.

Други странични ефекти:

- учестяване на сърдечната дейност
- повишаване на кръвното налягане, последвано от повишена тенденция към хеморагична диатеза
- увеличена саливация
- отворени очи (изсъхване на роговицата), мидриаза, нистагъм
- повишена чувствителност към акустична стимулация по време на анестезията, фазата на излизане от анестезията и възстановяването
- повишен мускулен тонус
- следанестетична възбуда, хиперрефлексия и издаване на звуци

7. ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета, котки

8. ДОЗИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ЖИВОТНИ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулна (I.M.) или бавна интравенозна (I.V.) инжекция

Котка:

A: 10 - 20 mg/kg.ж.т. за дребни хирургични процедури и болезнени манипулации. B: 20 - 30 mg/kg.ж.т. за всички процедури със среден интензитет на болката.

C: 30 – 40 mg/kg.ж.т. за големи хирургически процедури в зависимост от сложността и продължителността на интервенцията.

Комбинация с други препарати при сложни операции:

Котка: с xylazine:

6 - 10 mg/kg.ж.т. ketamine и

2 mg/kg.ж.т. xylazine.

Куче:

Ketamin 10 % трябва да се прилага при кучето само в комбинация с други седативни средства, инжективни или инхалационни анестетици.

Куче: с xylazine:

6 - 10 mg/kg.ж.т. ketamine и

2 mg/kg.ж.т. xylazine

Ketamin 10 % може да се използва за индукция на генерална анестезия и за поддържане на анестезия предизвикана с други наркотици, напр.: барбитурати (phenobarbital, thiamylal, xylazine) и инхалационни анестетици (halothane, methoxyflurane, nitrous oxide, ether и др.).

В този случай, Ketamin 10 % трябва да се прилага в редуцирана, средна доза както следва:

10 - 15 mg/kg.ж.т. при котка и 5.5 - 11 mg/kg.ж.т. при куче.

Като предварително третиране 15 – 20 минути преди операцията може да се инжектират секретоинхибиторни субстанции (напр. atropine, scopolamine), в доза 0.044 мгр/kg.ж.т. при котки и 0.05 мгр/kg.ж.т. при кучета.

При интрамускулно инжектиране, Ketamin 10 % е ефективен след 3 - 6 минути и действието му продължава около 20 минути и повече. При интравенозно инжектиране, Ketamin 10 % е ефективен незабавно (най – късно след 30 секунди) и продължителността на анестезията е около 10 минути и повече. Общо взето i.v. доза е около 1/4 до 1/3 от съответната i.m. доза.

Интравенозната инжекция трябва да се извършва бавно (продължителност най - малко 60 секунди) за избягване на интензивна респираторна депресия. По време на анестезията, фазата на събуждане и възстановяване е необходимо да се пази пълна тишина, за да се избегне начало на възбуда.

За удължаване на анестезията с кетамин, може да се повторят i.m. или i.v. инжекции, с половин или цяла доза в зависимост от изискванията, 20 минути след първото прилагане. При продължителни операции, роговицата на очите трябва да се предпази от изсъхване. При комбиниране с невролептици мускулните контракции се редуцират (напр. chlorpromazine в доза 0.55 mg/kg.ж.т.).

9. СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ

Интравенозната инжекция трябва да се извършва бавно (продължителност: най - малко 60 секунди) за избягване на интензивна респираторна депресия. За избягване изсъхването на корнеята (поради отворените очи), трябва да се прилага сигурна защита (напр. очни капки или мазила).

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо

11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява под 25 °C, защитен от светлина
Да се пази от деца

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 7 дни
Да не се използва след изтичане на срока на годност посочен на етикета

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които и предназначен ВМП:

При котки, кетамин може да има лек хипотермичен ефект. Телесната температура се понижава средно с 1.6°C след прилагане на терапевтичната доза.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Интравенозната инжекция трябва да се извършва бавно (продължителност: най-малко 60 секунди) за избягване на интензивна респираторна депресия. За избягване изсъхването на корнеята (поради отворените очи), трябва да се прилаг сигурна защита (напр. очни капки или мазила).

Бременност:

Ketamine преминава през плацентарната бариера.

Репродуктивни изследвания при бременни кучки не показват негативен ефект на кетамин върху майките и кученцата. Същите резултати са описани при по-старо изследване при бременни котки. След прилагане на кетамин в доза 25-100 mg/kg ж.т. върху бременни плъхове, хистологичните изследвания на фетални сърце, черен дроб и бъбреци показват патологични дегенеративни процеси.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Комбинираната употреба на седативни средства, ксилазин, невролептици, морфинови аналози, инжективни или инхалационни анестетици може да усили предизвиканата от ксилазина анестезия и предпазва от възбуда. При прилагането на една от тези комбинации се наблюдава по-интензивно подтискане на циркулацията и респирацията.

В допълнение комбинацията на кетамин с невролептици намалява мускулните контракции.

Премедикацията с атропин намалява предизвиканата от кетамин саливация.

Вероятно, кетамин и тироидните хормони съвместно усилват техния хипертензивен и тахикардиален ефект.

Пестицидите и инсектицидите може да стимулират микрозомалните метаболитни ензими и да доведат до намаляване ефективността на кетамин.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Предозирането може да предизвика централна възбуда водеща до конвулсии, респираторна парализа и сърдечна аритмия. Конвулсиите могат да се преодолеят с бензодиазепини.

Несъвместимости:

За избягване на несъвместимост да не се смесват барбитурати или диазепам.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДНИ МАТЕРИАЛИ

Попитайте Вашият ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТА НА ПОСЛЕДНОТО ОДОБРЯВАНЕ НА ЛИСТОВКАТА

12.2023 г.

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

10 ml, 5 x 10 ml, 25 ml, 10 x 25 ml

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР