

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

ПИПЕРАЗИН 20%

PIPERAZINE 20%

Перорален разтвор за свине и птици.

2. Състав

В 100 ml се съдържат:

Активно вещество:

Piperazine hexahydrate 20.0 g

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Свине и птици.

4. Показания за употреба

Лечение на аскаридоза при свинете, аскаридоза и капилариоза по птиците.

5. Противопоказания

Да не се използва при хронични заболявания на черния дроб, бъбреците и при забавена перисталтика на гастроинтестиналния тракт.

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Профилактиката на тези заболявания изисква провеждането на редица мероприятия: ежедневно механично почистване на изпражненията; обилно почистване на пода с вода и подсушаване; на всеки 10-15 дни дезинфекция с 10%-ви горещи содови разтвори.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, дихателна маска и защитни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Да не се пие, пуши или консумира храна при работа с продукта.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Птици носачки:

Може да се прилага в периода на яйценосене.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Пиперазинът и пирантела проявяват антагонистично взаимодействие. При едновременното прилагане пиперазин и хлорпромазин е възможна появата на гърчове. Едновременното приложение на пиперазин и очистителни продукти води до преждевременната елиминация на пиперазина.

Предозиране:

Терапевтичните дози са многократно по-ниски от токсичните. При приемането на токсични дози се наблюдават повръщане, слабост, депресия, дехидратация и в много редки случаи гърчове и смърт на животните.

След приемането на високи дози, трябва незабавно да се дадат очистителни средства, активен въглен и да се предприеме общо укрепваща терапия.

Основни несъвместимости:

Несъвместим е с пирантел, хлорпромазин и очистителни средства.

7. Неблагоприятни реакции

В предписаните дози не са наблюдавани.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Перорално, след добро хомогенизиране с мека храна, която се дава само вечер и при предварителна 12 - 15 часова гладна диета.

Свини: 0.6 - 2.0 ml/ kg телесна маса.

Птици: 2.0 - 3.0 ml/ kg телесна маса.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

12 до 14 часа след третирането е необходимо да се извършат следните мероприятия: механично почистване на изпражненията; обилно почистване на пода с вода и подсушаване; дезинфекция с 10%-ви горещи содови разтвори.

Желателно е след 2 месеца третирането да се повтори.

10. Карентни срокове

Свини (месо и вътрешни органи): 7 дни.

Птици (месо и вътрешни органи): нула дни.

Яйца: 7 дни.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 6 месеца.

Срок на годност след смесване с храната: използвайте незабавно.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като пиперазин може да бъде опасен за риби и други водни организми.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-2499

Пластмасови флакони от 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1.0 L, 2.0 L, 5.0 L, затварящи се с винтови пластмасови капачки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

04/2024

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД
гр. Шумен, ул. “Отец Паисий” № 40
Република България
тел./факс: 054/801-215
E-mail: farma_vet@abv.bg

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР