

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Fles van 100 ml en 500 ml, Doos met een fles van 100 ml of 500 ml****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

MULTIMIN oplossing voor injectie voor runderen

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per ml:

Zink: 60 mg, (overeenkomend met zinkoxide: 74,68 mg)

Mangaan: 10 mg, (overeenkomend met mangaancarbonaat: 20,92 mg)

Koper: 15 mg, (overeenkomend met kopercarbonaat: 26,09 mg)

Selenium: 5 mg, (overeenkomend met natriumseleniet: 10,95 mg)

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

Fles van 100 ml

Fles van 500 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund.

6. INDICATIE(S)Indicaties voor gebruik

Toedienen van sporenelementen om gelijktijdige klinische of subklinische deficiënties van selenium, koper, mangaan en zink te corrigeren die kunnen ontstaan tijdens kritieke fasen van de productie- of voortplantingscyclus.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor subcutane toediening. Niet intramusculair toedienen.

Dosis:

- Rund - Tot 1 jaar: 1 ml per 50 kg
- Rund - Van 1-2 jaar: 1 ml per 75 kg
- Rund - Ouder dan 2 jaar: 1 ml per 100 kg

Toedieningsschema:

Eénmalig toedienen tijdens, of vóór perioden van stress in de productie- en fokkerijcyclus die waarschijnlijk zullen leiden tot gelijktijdige klinische of subklinische deficiënties van de vier sporenelementen (bijvoorbeeld tijdens vervoer/verschepping, afkalven, dekken).

Maximaal volume per injectieplaats: 7ml

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD(EN)

Wachttijden

Vlees en slachtafval: 28 dagen.

Melk: nul uur.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Speciale waarschuwingen

Aanvullende koper, zink, mangaan of selenium mag niet tegelijkertijd worden toegediend.

Dit diergeneesmiddel heeft een HOGE concentratie aan selenium.

Vanwege een potentieel risico op seleniumtoxiciëit moet er bij het hanteren van het diergeneesmiddel voorzichtigheid worden betracht om accidentele zelfinjectie te voorkomen.

In geval van accidentele zelfinjectie dient ONMIDDELLIJK EEN ARTS TE WORDEN GERAADPLEEGD en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Na aanbreken gebruiken voor.....

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijderen van restanten in overeenstemming met lokale vereisten.

Dit gedeelte wordt enkel gedrukt op de buitenverpakking, aangezien het niet vereist is op de primaire verpakking.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. - Op diergeneeskundig voorschrift

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Dit gedeelte wordt enkel gedrukt op de buitenverpakking, aangezien het niet vereist is op de primaire verpakking.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Warburton Technology Limited,
36 Fitzwilliam Square,

Dublin 2,
IERLAND

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V583733

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

LOT: {nummer}