

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

250 ml, 1000 ml, 2500 ml, 5000 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Taurador 5 mg/ml Pour-on Lösung zum Übergießen für Rinder
Doramectin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jeder ml enthält:

Doramectin: 5 mg
Brillantblau FCF (E133): 0,007 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Übergießen

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

250 ml [1 l, 2,5 l, 5 l]

5. ZIELTIERART(EN)

Rind

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung des Befalls mit gastrointestinalen Rundwürmern, Lungenwürmern, Augenwürmern, Dasselfliegen, Haarlingen, Läusen, Räudemilben und Hornfliegen (Stechfliegen) beim Rind.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Eine Einzelbehandlung mit 500 µg Doramectin/kg Körpergewicht (entsprechend 1 ml des Tierarzneimittels pro 10 kg Körpergewicht).

Die Lösung wird entlang der Mittellinie des Rückens in einem schmalen Streifen zwischen dem Widerrist und dem Schwanzansatz aufgetragen.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

DOSIERANLEITUNG		DIE TIERE SOLLTEN GEWOGEN UND NACH KÖRPERGEWICHT GRUPPIERT WERDEN, UM UNTER- ODER ÜBERDOSIERUNG ZU VERMEIDEN*					
KÖRPERGEWICHT	DOSIS PRO TIER	ZAHL DER DOSEN PRO PACKUNG					
		250 ml	1 Liter	2,5 Liter	5 Liter	10 Liter	20 Liter
100 kg	10 ml	25	100	250	500	1000	2000
150 kg	15 ml	16	66	166	333	666	1333

200 kg	20 ml	12	50	125	250	500	1000
250 kg	25 ml	10	40	100	200	400	800
300 kg	30 ml	8	33	83	166	333	666
350 kg	35 ml	7	28	71	142	285	571
400 kg	40 ml	6	25	62	125	250	500
450 kg	45 ml	5	22	55	111	222	444
500 kg	50 ml	5	20	50	100	200	400
550 kg	55 ml	4	18	45	90	181	363
600 kg	60 ml	4	16	41	83	166	333

*Dosisrate: 1 ml pro 10 kg Körpergewicht.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 35 Tage.

Nicht bei laktierenden Kühen verwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trockenstehenden Kühen oder trächtigen Färsen innerhalb von 2 Monaten (60 Tagen) vor dem Abkalben anwenden.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

VORSICHTSMASSNAHMEN: LEICHT ENTZÜNDLICH; VON HITZE, OFFENER FLAMME, FUNKEN ODER SONSTIGEN ZÜNDQUELLEN FERNHALTEN.

Warnhinweise für den Anwender: Beim Auftragen sollten Gummihandschuhe und -stiefel sowie ein wasserabweisender Mantel getragen werden. Nur in gut belüfteten Bereichen oder im Freien anwenden.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage, um sich über die vollständigen Warnhinweise für Anwender zu informieren.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 3 Monate.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Vor Licht schützen.

Nicht im Kühlschrank lagern.

In der fest verschlossenen Originalverpackung aufbewahren.

Kontaminationen sind zu vermeiden.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

FÜR TIERE.

Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Ireland

Vertrieb:

PRO ZOON Pharma GmbH
Karl-Schönherr-Straße 3
A-4600 Wels

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 835194

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

250 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L, 20 L

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Taurador 5 mg/ml Pour-on Lösung zum Übergießen für Rinder
Doramectin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jeder ml enthält:

Doramectin: 5 mg
Brillantblau FCF (E133): 0,007 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Übergießen

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

250 ml [1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l]

5. ZIELTIERART(EN)

Rind

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 35 Tage.

Nicht bei laktierenden Kühen verwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trockenstehenden Kühen oder trächtigen Färsen innerhalb von 2 Monaten (60 Tagen) vor dem Abkalben anwenden.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 3 Monate.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Vor Licht schützen.
Nicht im Kühlschrank lagern.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Ireland

Vertrieb:
PRO ZOON Pharma GmbH
Karl-Schönherr-Straße 3
A-4600 Wels

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 835194

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.