

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BLAP HELP, injekcinis tirpalas galvijams (melžiamoms karvėms)

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

Veikliosios medžiagos:

Sorbitolio	100 mg
Gliukozės	20 mg
Inozitolio	10 mg
Acetilmetionino	25 mg
Arginino hidrochlorido	1.2 mg
Lizino hidrochlorido	1.2 mg
Kalcio gliukonato	20 mg
Magnio acetato	0.6 mg
Tiamino hidrochlorido	1 mg
Ciankobalamino	0.001 mg
Nikotinamido	5 mg

Pagalbinės medžiagos

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis	Kiekybinė sudėtis, jei ta informacija būtina siekiant tinkamai naudoti veterinarinį vaistą
Metilo parahidroksibenzoatas	0.48 mg
Propilo parahidroksibenzoatas	0.12 mg
Injekcinis vanduo	

Skaidrus raudonos spalvos tirpalas

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1 Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Galvijai (melžiamos karvės).

3.2 Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Galvijams elektrolitų ir skysčių kiekiui atstatyti, profilaktiškai nuo ketozės, parezės ir kitų ligų po atsivedimo, apsinuodijus, taip pat pieno sintezei skatinti.

3.3 Kontraindikacijos

Nėra.

3.4 Specialieji įspėjimai

Į veną švirkščiama lėtai. Švirkščiant po oda, vienoje injekcijos vietoje turi būti ne daugiau kaip 100 ml.

3.5 Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Į veną švirkščiama lėtai. Švirkščiant po oda, vienoje injekcijos vietoje turi būti ne daugiau kaip 100 ml.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būkite atsargūs, skirdami vaistą, kad išvengtumėte atsitiktinio įsišvirkštimo.

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės
Netaikytinos

3.6 Nepageidaujamos reakcijos

Galvijai (melžiamos karvės). Nėra.

Svarbu pranešti apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Ataskaitos turėtų būti siunčiamos, pageidautina per veterinarijos gydytoją, leidimo prekiauti turėtojų arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę ataskaitų teikimo sistemą. Atitinkamą kontaktinę informaciją taip pat žr. pakuotės lapelio 16 skyriuje.

3.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumas ir laktacija:

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

3.8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos veikos formos

Nežinoma.

3.9 Dozės ir naudojimo būdas

Norint užtikrinti teisingą dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį.

Vaistas turi būti švirkščiamas į veną, į pilvaplėvės ertmę arba po oda

Veterinarijos gydytojų įvertinus klinikinę būklę, 1-3 buteliukų turinį galima vartoti per dieną 3-5 dienas:

Į veną reikia suleisti 500, 1 000 arba 1 500 ml per parą.

800 arba 1 000 ml per parą reikia suleisti į pilvaplėvės ertmę.

500 ml per parą reikia švirkšti po oda.

Į veną švirkščiama lėtai.

Švirkščiant po oda, vienoje injekcijos vietoje turi būti ne daugiau kaip 100 ml.

3.10 Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Nežinomas.

Neviršykite rekomenduojamos dozės.

3.11 Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikoma.

3.12 Išlauka

0 parų.

4. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1 ATC vet kodas

QV06DE.

4.2 Farmakodinamika

BLAP HELP – tai hipertoninis tirpalas, kuriame yra aminorūgščių, mineralų, vitaminų ir energiją teikiančių (maistinių) medžiagų. Tai injekcinis tirpalas, kurio sudėtyje yra arginino hidrochlorido, lizino hidrochlorido, acetilmetionino, kalcio gliukonato, magnio acetato, magnio acetato, tiamino hidrochlorido, nikotinamido, cianokobalamino, sorbitolio, gliukozės, inozitolio ir metilo bei propilo parahidroksibenzoato, kurie atstato organizmo skysčius, apsaugo nuo galvijų ketozės ir poveršiavimosi sutrikimų.

4.3 Farmakokinetika

Sugirdyta gliukozė greitai ir lengvai pasisavinama aktyviuoju transportavimo keliu. Sergant hipoglikemija, gliukozės kiekis kraujyje paprastai padidėja po 10-20 min., didžiausia koncentracija būna po 40 min. Išsiskiriant energijai, organizme gliukozė virsta anglies dioksidu ir vandeniu.

Metioninas organizme virsta cisteinu, cistationu, cisterinu, taurinu ir organiniais sulfatais. D izomeras in vivo paverčiamas L forma.

Sorbitolis absorbuojamas lėčiau nei sacharozė, vėliau kepenyse suskaidomas į fruktozę, o vėliau į gliukozę. Inozitolis greitai absorbuojamas ir metabolizuojamas taip pat, kaip ir gliukozė.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1 Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

5.2 Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, - 3 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, - sunaudoti nedelsiant.

5.3 Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo šviesos.

5.4 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo stikliniai buteliukai po 500 ml, užkimšti chlorobutilo gumos kamščiais ir apgaubti aliuminio gaubteliu.

Plastikiniai (polipropileniniai) buteliukai po 500 ml, užkimšti chlorobutilo gumos kamščiais ir apgaubti aliuminio gaubteliu.

5.5 Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba išmesti į buitines atliekas.

Nepanaudotą veterinarinį vaistą ar su juo susijusias atliekas naikinkite pagal vietinius reikalavimus ir visas nacionalines surinkimo sistemas, taikomas atitinkamam veterinariniam vaistui.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

IZO srl a socio unico

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (IAI)

LT/2/08/1792/001 - Kartoninė dėžutė, kurioje yra 500 ml stiklinis buteliukas (II tipo).

LT/2/08/1792/002 - Kartoninė dėžutė, kurioje yra 500 ml plastikiniai (polipropileno) buteliai.

8. REGISTRAVIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 20/05/2008.

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2024-02-23

10. VETERINARINIŲ VAISTO KLASIFIKACIJA

Nereceptinis veterinarinis vaistas.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą rasite Sąjungos produktų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 500 ml stiklinis buteliukas (II tipo).

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 500 ml plastikiniai (polipropileno) buteliai.

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BLAP HELP, injekcinis tirpalas galvijams (melžiamoms karvėms).

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

1 ml tirpalo yra:

Veikliosios medžiagos:

Sorbitolio	100 mg
Gliukozės	20 mg
Inozitolio	10 mg
Acetilmetionino	25 mg
Arginino hidrochlorido	1.2 mg
Lizino hidrochlorido	1.2 mg
Kalcio gliukonato	20 mg
Magnio acetato	0.6 mg
Tiamino hidrochlorido	1 mg
Ciankobalamino	0.001 mg
Nikotinamido	5 mg

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (melžiamos karvės).

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Vaistą galima švirkšti į veną (lėtai), į pilvą arba po oda

5. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

6. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius sunaudoti nedelsiant.

7. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo šviesos.

8. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

IZO srl a socio unico

9. SERIJOS NUMERIS

Serija{numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 500 ml stiklinis buteliukas (II tipo).

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 500 ml plastikiniai (polipropileno) buteliai.

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BLAP HELP, injekcinis tirpalas galvijams (melžiamoms karvėms).

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGA (-OS)

1 ml tirpalo yra:

Veikliosios medžiagos:

Sorbitolio	100 mg
Gliukozės	20 mg
Inozitolio	10 mg
Acetilmetionino	25 mg
Arginino hidrochlorido	1.2 mg
Lizino hidrochlorido	1.2 mg
Kalcio gliukonato	20 mg
Magnio acetato	0.6 mg
Tiamino hidrochlorido	1 mg
Ciankobalamino	0.001 mg
Nikotinamido	5 mg

3. PAKUOTĖS DYDIS

500 ml.

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (melžiamos karvės).

5. INDIKACIJA (-OS)

Galvijams elektrolitų ir skysčių kiekiui atstatyti, profilaktiškai nuo ketozės, parezės ir kitų ligų po atsivedimo, apsinuodijus, taip pat pieno sintezei skatinti.

6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Vaistas gali būti švirkščiamas į veną, į pilvą arba po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

7. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

8. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atidarius sunaudoti nedelsiant.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Saugoti nuo šviesos.

10. NUORODA „PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ PRIEŠ NAUDOJIMĄ“

Prieš naudojimą būtina perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

IZO srl a socio unico

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/08/1792/001-002

15. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija{numeris}

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

BLAP HELP, injekcinis tirpalas galvijams (melžiamoms karvėms)

2. Sudėtis

1 ml tirpalo yra:

Veikliosios medžiagos:

Sorbitolio	100 mg
Gliukozės	20 mg
Inozitolio	10 mg
Acetilmetionino	25 mg
Arginino hidrochlorido	1.2 mg
Lizino hidrochlorido	1.2 mg
Kalcio gliukonato	20 mg
Magnio acetato	0.6 mg
Tiamino hidrochlorido	1 mg
Cianokobalamino	0.001 mg
Nikotinamido	5 mg

Pagalbinės medžiagos

<Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis>	<Kiekybinė sudėtis, jei ta informacija būtina siekiant tinkamai naudoti veterinarinį vaistą>
Metilo parahidroksibenzoatas	0.48 mg
Propilo parahidroksibenzoatas	0.12 mg
Injekcinis vanduo	

Skaidrus raudonos spalvos tirpalas.

3. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Galvijai (melžiamos karvės).

4. Naudojimo indikacijos

Galvijams elektrolitų ir skysčių kiekiui atstatyti, profilaktiškai nuo ketozės, parezės ir kitų ligų po atsivedimo, apsinuodijus, taip pat pieno sintezei skatinti.

5. Kontraindikacijos

Nėra.

6. Specialieji įspėjimai

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Į veną švirkščiama lėtai. Švirkščiant po oda, vienoje injekcijos vietoje turi būti ne daugiau kaip 100 ml.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būkite atsargūs, skirdami vaistą, kad išvengtumėte atsitiktinio įsišvirkštimo.

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos

Vaikingumas ir laktacija

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitos sąveikos formos:

Nežinoma.

Perdozavimas:

Nežinoma.

Neviršyti rekomenduojamos dozės.

Specialūs naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos

Netaikoma.

Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

7. Nepalankios reakcijos

Galvijai (melžiamos karvės):

Nežinoma.

Svarbu pranešti apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti gaminio saugumą. Jeigu pastebėjote bet kokią šalutinį poveikį, net nenurodytą šiame pakuotės lapelyje, arba manote, kad vaistas neveikė, pirmiausia kreipkitės į veterinarijos gydytoją. Taip pat galite pranešti apie bet kokius nepageidaujamus reiškinius rinkodaros leidimo turėtojui arba vietiniam rinkodaros teisės turėtojo atstovui, naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba per savo nacionalinę pranešimų teikimo sistemą:
<https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/veterinariniai-vaistai-ir-biocidai/farmakologinis-budrumas>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodai kiekvienai rūšiai

Vaistas turi būti švirkščiamas į veną, į pilvaplovės ertmę arba po oda

Veterinarijos gydytojui įvertinus klinikinę būklę, 1-3 buteliukų turinį galima vartoti per dieną 3-5 dienas:

Į veną reikia suleisti 500, 1 000 arba 1 500 ml per parą.

800 arba 1 000 ml per parą reikia suleisti į pilvaplovės ertmę.

500 ml per parą reikia švirkšti po oda.

Į veną švirkščiama lėtai.

Švirkščiant po oda, vienoje injekcijos vietoje turi būti ne daugiau kaip 100 ml.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Į veną švirkščiama lėtai.

Švirkščiant po oda, vienoje injekcijos vietoje turi būti ne daugiau kaip 100 ml.

10. Išlauka

0 parų.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Saugoti nuo šviesos.

Ant etiketės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio veterinarinio vaisto vartoti negalima.

Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę: sunaudoti nedelsiant.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba išmesti į buitines atliekas.

Nesunaudoto veterinarinio vaisto ar jo atliekų naikinimo schemas taikomos pagal vietinius reikalavimus ir visas taikomas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turėtų padėti apsaugoti aplinką.

Kaip išmesti nebereikalingus vaistus, teiraukitės veterinarijos gydytojo arba vaistininko.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Nereceptinis veterinarinis vaistas.

14. Registracijos numeris ir pakuočių dydžiai

LT/2/08/1792/001 – Kartoninė dėžutė, kurioje yra 500 ml stiklinis buteliukas (II tipo).

LT/2/08/1792/002 - Kartoninė dėžutė, kurioje yra 500 ml plastikiniai (polipropileno) buteliai.

15. Pakuotės laelio paskutinės peržiūros data

2024-02-23

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą rasite Sąjungos Produktų Duomenų bazėje

(<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Regisruotojas

IZO S.r.l. a socio unico

Via San Zeno, 99/A

25124 Brescia

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

IZO S.r.l. a socio unico

S.S. 234 Km 28.2

27013 Chignolo Po (PV)

Vietinis atstovas ir kontaktiniai duomenys pranešimui apie įtariamą nepageidaujamą reakciją:

UAB Dimedium Lietuva

Islandijos pl. 217-13, Kaunas

LT-49165, Lietuva

Tel.Nr. +370 615 64241

El.p. info@dimedium.lt

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį veterinarinį vaistą, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

17. Kita informacija

Blap Help – hipertoninis tirpalas, kurio sudėtyje yra amino rūgščių, mineralų, vitaminų ir energijos teikiančių (maisto) medžiagų.

Nereceptinis veterinarinis vaistas.