

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

MULTIJECT IMM, intramaminė suspensija

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename 5 g švirkšte yra:

veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):

penicilino prokaino druskos	100 000 TV,
streptomicino sulfato	100 mg,
neomicino sulfato	100 mg,
prednizolono	10 mg;

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų): iki 5 g.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Intramaminė suspensija.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Melžiamos karvės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Karvėms, laktacijos metu sergančioms ūminiu ar poūmiu skausmingu mastitu, kurio sukėlėjai yra jautrūs penicilinui, streptomycinui bei neomicinui, gydyti.

4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

4.4. Specialieji išpėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Gydymo metu situaciją turi kruopščiai įvertinti veterinarijos gydytojas.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali įjautrinti organizmą (sukelti alergiją). Žmonės, jautrūs penicilinams, gali būti kryžmiškai jautrūs cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos šioms medžiagoms kartais gali būti sunkios.

Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas cefalosporinams, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Naudojant veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės. Pasireiškus jautrumo požymiams, pvz., paraudus odai, naudojus preparatą, reikia kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šį išpėjimą. Veido, lūpų ar akių tinimas, pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni požymiai ir jiems pasireiškus būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinomos.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms ar laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Išmelžus pieną, kruopščiai nuvalius ir dezinfekavus spenio galą, į kiekvieną tešmens ketvirtį per spenio kanalą, laikantis aseptikos reikalavimų, reikia sušvirkšti po vienkartinio švirkšto turinį. Gydyti vieną kartą per dieną, 3 d. iš eilės.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Nežinomas.

4.11. Išlauka

Galvijienai – 7 paros, pienui – 72 val.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: intramaminės antibakterinės medžiagos.

ATCvet kodas: QJ51RC23.

Benzilpenicilino prokaino druska veikia besidauginančias bakterijas, slopina jų sienelės sintezę. Streptomicino sulfatas ir neomicino sulfatas yra aminoglikozidiniai antibiotikai, kurie, patekę į bakterijos vidų, jungiasi su ribosomų 30S subvieneto receptoriais, sutrikdo transportinės RNR (tRNR) genetinio kodo atpažinimą ir baltymų gamybą. Prednizolonas yra gliukokortikoidas, kuris pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Skystasis parafinas,
baltas minkštas parafinas.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nėra.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Polietileniniai vienkartiniai švirkštai po 5 g, kartoninėse dėžutėse po 24 vnt.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Airija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/97/0433/001

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 1997-02-28
Perregistravimo data 2007-07-16

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2021-09-13

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

MULTIJECT IMM, intramaminė suspensija

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Viename 5 g švirkšte yra:

penicilino prokaino druskos	100 000 TV,
streptomicino sulfato	100 mg,
neomicino sulfato	100 mg,
prednizolono	10 mg;

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų)	iki 5 g.
--	-----------------

3. VAISTO FORMA

Intramaminė suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

24 švirkštai po 5 g.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Melžiamos karvės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Karvėms, laktacijos metu sergančioms ūminiu ar poūmiu skausmingu mastitu, kurio sukėlėjai yra jautrūs penicilinui, streptomycinui bei neomicinui, gydyti.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Išmelžus pieną, kruopščiai nuvalius ir dezinfekavus spenio galą, į kiekvieną tešmens ketvirtį per spenio kanalą laikantis aseptikos reikalavimų reikia sušvirkšti po vienkartinio švirkšto turinį. Gydyti vieną kartą per dieną, 3 d. iš eilės.

8. IŠLAUKA

Išlauka: galvijienai – 7 paros, pienui – 72 val.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojant būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Airija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/97/0433/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ**ŠVIRKŠTAS****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

MULTIJECT IMM, intramaminė suspensija

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Viename 5 g švirkšte yra:

benzilpenicilino prokaino druskos	100 000TV,
streptomicino sulfato	100 mg,
neomicino sulfato	100 mg,
prednizolono	10 mg.

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

5 g

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti į tešmenį.

5. IŠLAUKA

Išlauka: galvijienai – 7 paros, pienui – 72 val.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
MULTIJECT IMM, intramaminė suspensija

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Airija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Norbrook Manufacturing Ltd
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Airija

Norbrook Laboratories Ltd,

Station Works
Camlough Road
Newry, Co. Down
BT35 6JP
Jungtinė Karalystė

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

MULTIJECT IMM, intramaminė suspensija

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename 5 g švirkšte yra:

veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):

penicilino prokaino druskos	100 000 TV,
streptomicino sulfato	100 mg,
neomicino sulfato	100 mg,
prednizolono	10 mg;

pagalbinės (-ių) medžiagos(-ų)	iki 5 g.
---------------------------------------	----------

4. INDIKACIJA (-OS)

Karvėms, laktacijos metu sergančioms ūminiu ar poūmiu skausmingu mastitu, kurio sukėlėjai yra jautrūs penicilinui, streptomicinui bei neomicinui, gydyti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet koki šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Melžiamos karvės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Išmelžus pieną, kruopščiai nuvalius ir dezinfekavus spenio galą, į kiekvieną tešmens ketvirtį per spenio kanalą, laikantis aseptikos reikalavimų, reikia sušvirkšti po vienkartinio švirkšto turinį. Gydyti vieną kartą per dieną, 3 d. iš eilės.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Gydymo metu situaciją turi kruopščiai įvertinti veterinarijos gydytojas. Galima naudoti vaikingoms patelėms ar laktacijos metu.

10. IŠLAUKA

Galvijienai – 7 paros, pienui – 72 val.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali įjautrinti organizmą (sukelti alergiją). Žmonės, jautrūs penicilinams, gali būti kryžmiškai jautrūs cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos šioms medžiagoms kartais gali būti sunkios.

Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas cefalosporinams, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Naudojant veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės.

Pasireiškus jautrumo požymiams, pvz., paraudus odai, naudojus preparatą, reikia kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šį įspėjimą. Veido, lūpų ar akių tinimas, pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni požymiai ir jiems pasireiškus būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2021-09-13

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: intramaminės antibakterinės medžiagos.

ATCvet kodas: QJ51RC23.

Benzilpenicilino prokaino druska veikia besidauginančias bakterijas, slopina jų sienelės sintezę.

Streptomicino sulfatas ir neomicino sulfatas yra aminoglikozidiniai antibiotikai, kurie, patekę į bakterijos vidų, jungiasi su ribosomų 30S subvieneto receptoriais, sutrikdo transportinės RNR (tRNR) genetinio kodo atpažinimą ir baltymų gamybą. Prednizolonas yra gliukokortikoidas, kuris pasižymi prieš uždegiminėmis savybėmis.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

Magnum Veterinarija, UAB
Martinavos g. 8, Martinavos k.,
LT-54463 Kauno r., Lietuva
Tel. +370 688 96944
info@magnumvet.lt