

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

TAbic IB VAR206, šnypščiosios tabletės suspensijai ruošti vištoms.

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje vakcinos dozėje yra:

veikliosios medžiagos

gyvo nusilpninto paukščių infekcinio bronchito viruso, 2-06 padermės – ne mažiau kaip $10^{3,2}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,4}$ EID₅₀*

*EID₅₀ – 50 % embrionų infekcinė dozė. Statistiškai nustatytas viruso kiekis, kuriuo galima tikėtis užkrėsti 50 procentų apvaisintų kiaušinių, kurie juo paskiepyti.

Pagalbinių medžiagų:

išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Šnypščiosios tabletės suspensijai.

Apvalios balkšvos tabletės.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1 Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Vištos (broileriai ir būsimos dedeklės).

4.2 Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Vištoms aktyviai imunizuoti norint sumažinti mirtingumą, klinikinius požymius ir pažeidimus, susijusius su IB viruso 2 varianto padermių sukeliama infekcija.

Imuniteto pradžia: 3 savaitėms po vienkartinės dozės vartojimo 1 dienos amžiaus.

Imuniteto trukmė: iki 35/36 dienų amžiaus.

4.3 Kontraindikacijos

Nėra.

4.4 Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

Vakcinavimas TAbic IBVAR206 apsaugo vištas nuo kvėpavimo sistemos simptomų, kuriuos sukelia IBV 2 variantas, ir neturi pakeisti vakcinavimo nuo klasikinio infekcinio bronchito plano.

4.5 Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vakcinuotos vištos gali išskirti vakcininės padermės mikroorganizmus po vakcinavimo.

Vakcininės padermės mikroorganizmai gali išplisti tarp vištų. Reikia atskirti vakcinuotas ir

nevakcinuotas vištas. Visos vienos vištidės vištos turi būti vakcinuotos tuo pačiu metu. Norint išvengti vakcininės padermės mikroorganizmų išplitimo tarp imlių rūšių gyvūnų, reikėtų taikyti atitinkamas veterinarines ir gyvūnų laikymo priemones.

Ši vakcina turi būti naudojama tik nustačius, kad 2 variantas IBV yra epidemiologiškai svarbus. Reikia vengti TABic IBVAR206 vakcinos patekimo į vietas, kuriose 2 varianto IBV dar nėra.

Negalima naudoti pažeistose lizdinės plokštelės dalyse esančių tablečių.
Negalima saugoti jokios nepanaudotos vakcinos dalies naudoti kitą dieną.
Negalima naudoti per mažos dozės. Perdozuoti yra saugiau, nei naudoti per mažą dozę.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės – vandeniui nelaidžios pirštinės, kaukė ir apsauginiai akiniai.
Po darbo su vakcina darbuotojai turi nusiplauti rankas.

4.6 Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nėra.

4.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu ir 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

4.8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima naudoti kartu su vakcinomis nuo Niukaslų ligos.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu (išskyrus pirmiau minėtas aplinkybes). Todėl sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

4.9 Dozės ir naudojimo būdas

Vakciną reikia naudoti purškiant stambiais lašais (inhaliacija) nuo 1-os amžiaus dienos. Rekomenduojama kartoti vakcinavimą paukščiams sulaukus 10–14 dienų amžiaus. Dedeklėms gali būti skirti papildomi vakcinavimai. Dėl vakcinavimo programos visada reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju.

Vakcinavimas purškiant stambiais lašais (inhaliacija). Šis metodas gali būti naudojamas perykloje 1-os dienos amžiaus viščiukams tuo po išsiperėjimo arba vyresnėms vištomis vištidedėje.

Toliau nurodytas tipinis kiekis, kurį galima naudoti po atskiedimo. Kai kuriais atvejais jį gali reikėti pakoreguoti, laikantis purkštuvo gamintojo nurodymų.

Pateikimas (dozių tabletėje)	Vandens kiekis (ml), kurį reikia naudoti atskiesti - naudojimas perykloje	Vandens kiekis (ml), kurį reikia naudoti atskiesti - naudojimas vištidedėje
500	125–150	100–200
1 000	250–300	200–400
1 500	375–450	300–600
2 000	500–600	400–800
2 500	625–750	500–1 000

3 000	750–900	600–1 200
3 500	875–1 050	700–1 400
4 000	1 000–1 200	800–1 600
4 500	1 125–1 350	900–1 800
5 000	1 250–1 500	1 000–2 000
10 000	2 500–3 000	2 000–4 000

Vakcinavimas perykloje purškiant stambiais lašais (inhaliacija)

Vakcinavimas perykloje paprastai atliekamas automatinio purkštuvu, kuris aktyvinamas dėžėms su viščiukais judant konvejeriu. Kitas purškimo būdas – naudoti rankinį purkštuvą. Abiem atvejais lašeliai turi būti maždaug 100–200 µm (mikrometrų) skersmens ir purškiama taip, kad viščiukai liktų šlapi. 25–30 ml vandens kiekyje turi būti 100 vakcinos dozių ir jo turi pakakti 100 viščiukų.

Veiksmai prieš vakcinuojant perykloje

1. Užtikrinti, kad įranga būtų švari, be dezinfekavimo medžiagų bei ploviklių likučių ir veiktų tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų pakankamai šalto (10–15 °C), prieš tai užvirinto vandentiekio vandens – po 250–300 ml kiekvienam 1 000 dozių.
3. Sukalibruoti purkštuvą taip, kad būtų purškiama 100–200 µm (mikrometrų) skersmens lašeliais.
4. Pridėti į vandenį mėlyno dažiklio.
5. Išbandyti purkštuvą praleidžiant pro jį tuščią dėžę, kad įsitikinti, jog lašeliai yra tinkamo dydžio ir vakcina tolygiai padengia dėžę.

Pasiruošimas

1. Sudėti pakankamai tablečių į vandens talpyklę ir palaukti, kol jos visiškai ištirps (tai trunka ne ilgiau kaip 5 minutes).
2. Supilti ištirpintą vakciną į purkštovo rezervuarą ir atsargiai sumaišyti.

Purškimas

1. Stebėti purkštukų veikimą.
2. Stebėti vandens temperatūrą (10–15 °C).
3. Atskiedus vandeniu vakcina išlieka visiškai aktyvi 3 valandų laikotarpį, tačiau geriausia ją panaudoti nedelsiant po atskiedimo.

Stebėjimas

Stebėti vakcinavimo sąlygas tikrinant mėlynus dažus ant viščiukų plunksnų ir ranka juos perbraukiant bei įsitikinant, kad jie visi sušlapo. Apipurkštus viščiukus, kol jie dar šlapi, laikyti uždaroje tinkamai šildomoje patalpoje, kur nėra vėsaus vėjo.

Vakcinavimas ūkyje purškiant stambiais lašais (inhaliacija)

Vakcinavimas ūkyje atliekamas varikliniais arba rankiniais purkštuvais. Šiuo atveju lašeliai taip pat turi būti 100–200 µm (mikrometrų) skersmens. Vakcinai ištirpinti reikiamas vandens kiekis priklauso nuo aparato ir purškimo angos.

Veiksmai prieš vakcinuojant ūkyje

1. Užtikrinti, kad įranga būtų švari, be dezinfekavimo medžiagų bei ploviklių likučių ir veiktų tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų pakankamai šalto (10–15 °C), prieš tai užvirinto vandentiekio vandens – po 200–400 ml kiekvienam 1 000 dozių.
3. Sukalibruoti purkštuvą taip, kad būtų purškiama 100–200 µm (mikrometrų) skersmens lašeliais.
4. Pridėti į vandenį mėlyno dažiklio.
5. Išbandyti purkštuvą papurškiant ant švarių grindų.
6. Jeigu purkštuvą rankinis, išbandyti ėjimo greitį purkšdami vandenį.

Pasiruošimas

1. Sudėti pakankamai tablečių į vandens talpyklę ir palaukti, kol jos visiškai ištirps (tai trunka ne ilgiau kaip 5 minutes).
2. Supilti ištirpintą vakciną į purkštuvą rezervuarą ir atsargiai sumaišyti.

Purškimas

1. Suginti vištas į vieną vištidės pusę.
2. Išjungti vėdinimą.
3. Įjungti visas šviesas.
4. Vakciną purškiantis asmuo turi lėtai vaikščioti palei vištų būrį ir purkšti vakciną 50–100 cm virš vištų galvų.
5. Pasirūpinti, kad visi paukščiai būtų padengti vakcinos tirpalu.
6. Praėjus 10–20 minučių po vakcinavimo įjungti vėdinimą.
7. Atskiedus vandeniu vakcina išlieka visiškai aktyvi 3 valandų laikotarpį, tačiau geriausia ją panaudoti nedelsiant po atskiedimo.

Purškimui naudojamus įrenginius reikia plauti karštu virintu vandeniu.
Prieš vakcinuojant reikia patikrinti purkštuvą talpą.

4.10 Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Tyrimais patvirtinta, kad vakcina saugi net perdozavus 10 kartų.

4.11 Išlauka

0 parų.

5. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: imunologiniai preparatai paukščiams, naminiams paukščiams, gyvos virusinės vakcinos.

ATCvet kodas: QI01AD07 (paukščių infekcinio bronchito virusas).

Vakcina skatina susidaryti aktyvų imunitetą paukščių infekcinio bronchito virusui. Vakcininės padermės klasifikuojama kaip IB varianto 2-06 vakcininė padermė.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Trehalozė dihidratas,
natrio – vandenilio karbonatas,
citrinų rūgštis, bevandenė,
magnio stearatas.

6.2 Pagrindiniai nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokių kitų veterinarinių vaistų (išskyrus paminėtą 4.8 skyriuje.).

6.3 Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 18 mėn.
Tinkamumo laikas, ištirpinus arba atskiedus pagal nurodymus, – 3 val.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

6.5 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Tabletės (po 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 arba 10 000 dozių) supakuotos į aliuminio lizdines plokšteles: minkštas sidabrinis aliuminis (PVC / PVDC) – sidabrinis aliuminis (PVC).

Kiekvienoje lizdinėje plokštelėje yra 10 tablečių. Kartoninėje dėžutėje yra 1 arba 2 lizdinės plokštelės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

Lenkija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/20/2570/001-022

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2020-01-27

Perregistravimo data: 2021-11-08

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2023-03-06

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**Kartoninė dėžutė****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

TABIC IB VAR206, šnypščiosios tabletės suspensijai ruošti vištoms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje vakcinos dozėje yra:

gyvo nusilpninto paukščių infekcinio bronchito viruso, 2-06 padermės – ne mažiau kaip $10^{3,2}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,4}$ EID₅₀***3. VAISTO FORMA**

Šnypščiosios tabletės suspensijai.

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 tablečių po 500 (1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 arba 10 000) dozių.

20 tablečių po 500 (1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 arba 10 000) dozių.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vištos (broileriai ir būsimos dedeklės).

6. INDIKACIJA (-OS)**7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS**

Purškimas stambiais lašais (inhaliacija).

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Ištirpinus vaistą sunaudoti per 3 val.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).
Saugoti nuo šviesos.
Negalima sušaldyti.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama tik veterinarijos gydytojui.
Naudoti tik prižiūrint veterinarijos gydytojui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
Lenkija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/20/2570/001
LT/2/20/2570/002
LT/2/20/2570/003
LT/2/20/2570/004
LT/2/20/2570/005
LT/2/20/2570/006
LT/2/20/2570/007
LT/2/20/2570/008
LT/2/20/2570/009
LT/2/20/2570/010
LT/2/20/2570/011
LT/2/20/2570/012
LT/2/20/2570/013
LT/2/20/2570/014
LT/2/20/2570/015
LT/2/20/2570/016
LT/2/20/2570/017

LT/2/20/2570/018
LT/2/20/2570/019
LT/2/20/2570/020
LT/2/20/2570/021
LT/2/20/2570/022

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

TAbic IB VAR206, šnypščiosios tabletės suspensijai ruošti vištoms.

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

500 (1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 10 000) dozių

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}:

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS

TAbic IB VAR206, šnypščiosios tabletės suspensijai ruošti vištoms.

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas:

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
Lenkija

Importuotojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

ABIC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 17
63-100 Śrem
Lenkija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

TAbic IB VAR206, šnypščiosios tabletės suspensijai ruošti vištoms.

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje vakcinos dozėje yra:
gyvo nusilpninto paukščių infekcinio bronchito viruso, 2-06 padermės – ne mažiau kaip $10^{3,2}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,4}$ EID₅₀*

*EID₅₀ – 50 % embrionų infekcinė dozė. Statistiškai nustatytas viruso kiekis, kuriuo galima tikėtis užkrėsti 50 procentų apvaisintų kiaušinių, kurie juo paskiepyti.

Apvalios balkšvos tabletės.

4. INDIKACIJA (-OS)

Vištoms aktyviai imunizuoti norint sumažinti mirtingumą, klinikinius požymius ir pažeidimus, susijusius su IB viruso 2 varianto padermių sukeliama infekcija.

Imuniteto pradžia: 3 savaitėms po vienkartinės dozės vartojimo 1 dienos amžiaus.

Imuniteto trukmė: iki 35/36 dienų amžiaus.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nėra.

Pastebėjus bet koki šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vištos (broileriai ir būsimos dedeklės).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vakciną reikia naudoti purškiant stambiais lašais (inhaliacija) nuo 1-os dienos amžiaus.

Rekomenduojama kartoti vakcinavimą paukščiams sulaukus 10–14 dienų amžiaus.

Dedeklėms gali būti skirti papildomi vakcinavimai.

Dėl vakcinavimo programos visada reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju.

Vakcinavimas purškiant stambiais lašais (inhaliacija). Šis metodas gali būti naudojamas perykloje 1 – os dienos amžiaus viščiukams tuo po išsiperėjimo arba vyresnėms vištomis vištidėje.

Toliau nurodytas tipinis kiekis, kurį galima naudoti po atskiedimo. Kai kuriais atvejais jį gali reikėti pakoreguoti, laikantis purkštuvų gamintojo nurodymų.

Pateikimas (dozių tabletėje)	Vandens kiekis (ml), kurį reikia naudoti atskiesti - naudojimas perykloje	Vandens kiekis (ml), kurį reikia naudoti atskiesti - naudojimas vištidėje
500	125–150	100–200
1 000	250–300	200–400
1 500	375–450	300–600
2 000	500–600	400–800
2 500	625–750	500–1 000
3 000	750–900	600–1 200
3 500	875–1 050	700–1 400
4 000	1 000–1 200	800–1 600
4 500	1 125–1 350	900–1 800
5 000	1 250–1 500	1 000–2 000
10 000	2 500–3 000	2 000–4 000

Vakcinavimas perykloje purškiant stambiais lašais (inhaliacija)

Vakcinavimas perykloje paprastai atliekamas automatinio purkštuvu, kuris aktyvinamas dėžėms su viščiukais judant konvejeriu. Kitas purškimo būdas – naudoti rankinį purkštuvą. Abiem atvejais lašeliai turi būti maždaug 100–200 µm (mikrometrų) skersmens ir purškiama taip, kad viščiukai liktų šlapi. 25–30 ml vandens kiekyje turi būti 100 vakcinų dozių ir jo turi pakakti 100 viščiukų.

Veiksmai prieš vakcinuojant perykloje

1. Užtikrinti, kad įranga būtų švari, be dezinfekavimo medžiagų bei ploviklių likučių ir veiktų tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų pakankamai šalto (10–15 °C), prieš tai užvirinto vandentiekio vandens – po 250–300 ml kiekvienam 1 000 dozių.
3. Sukalibruoti purkštuvą taip, kad būtų purškiama 100–200 µm (mikrometrų) skersmens lašeliais.
4. Pridėti į vandenį mėlino dažiklio.
5. Išbandyti purkštuvą praleidžiant pro jį tuščią dėžę, kad įsitikinti, jog lašeliai yra tinkamo dydžio ir vakcina tolygiai padengia dėžę.

Pasiruošimas

1. Sudėti pakankamai tablečių į vandens talpyklę ir palaukti, kol jos visiškai ištirps (tai trunka ne ilgiau kaip 5 minutes).
2. Supilti ištirpintą vakciną į purkštuvo rezervuarą ir atsargiai sumaišyti.

Purškimas

1. Stebėti purkštukų veikimą.
2. Stebėti vandens temperatūrą (10–15 °C).
3. Atskiedus vandenių vakcina išlieka visiškai aktyvi 3 valandų laikotarpį, tačiau geriausia ją panaudoti nedelsiant po atskiedimo.

Stebėjimas

Stebėti vakcinavimo sąlygas tikrinant mėlynus dažus ant viščiukų plunksnų ir ranka juos perbraukiant bei įsitikinant, kad jie visi sušlapo. Apipurkštus viščiukus, kol jie dar šlapi, laikyti uždaroje tinkamai šildomoje patalpoje, kur nėra vėsaus vėjo.

Vakcinavimas ūkyje purškiant stambiais lašais (inhaliacija)

Vakcinavimas ūkyje atliekamas varikliniais arba rankiniais purkštuvais. Šiuo atveju lašeliai taip pat turi būti 100–200 µm (mikrometrų) skersmens. Vakcinai ištirpinti reikiamas vandens kiekis priklauso nuo aparato ir purškimo angos.

Veiksmai prieš vakcinuojant ūkyje

1. Užtikrinti, kad įranga būtų švari, be dezinfekavimo medžiagų bei ploviklių likučių ir veiktų tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų pakankamai šalto (10–15 °C), prieš tai užvirinto vandentiekio vandens kiekiu – po 200–400 ml kiekvienam 1 000 dozių.
3. Sukalibruoti purkštuvą taip, kad būtų purškiama 100–200 µm (mikrometrų) skersmens lašeliais.
4. Pridėti į vandenį mėlyno dažiklio.
5. Išbandyti purkštuvą papurškiant ant švarių grindų.
6. Jeigu purkštuvas rankinis, išbandyti ėjimo greitį purkšdami vandenį.

Pasiruošimas

1. Sudėti pakankamai tablečių į vandens talpyklę ir palaukti, kol jos visiškai ištirps (tai trunka ne ilgiau kaip 5 minutes).
2. Supilti ištirpintą vakciną į purkštuvo rezervuarą ir atsargiai sumaišyti.

Purškimas

1. Suginti vištas į vieną vištidės pusę.
2. Išjungti vėdinimą.
3. Įjunkite visas šviesas.
4. Vakciną purškiantis asmuo turi lėtai vaikščioti palei vištų būrį ir purkšti vakciną 50–100 cm virš vištų galvų.
5. Pasirūpinkite, kad visi paukščiai būtų padengti vakcinės tirpalu.
6. Praėjus 10–20 minučių po vakcinavimo įjungti vėdinimą.
7. Atskiedus vandenių vakcina išlieka visiškai aktyvi 3 valandų laikotarpį, tačiau geriausia ją panaudoti nedelsiant po atskiedimo.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Purškimui naudojamus įrenginius reikia plauti karštu virintu vandeniu. Prieš vakcinuojant reikia patikrinti purkštuvo talpą.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – 3 val.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

Vakcinavimas TABic IBVAR206 apsaugo vištas nuo kvėpavimo sistemos simptomų, kuriuos sukelia IBV 2 variantas, ir neturi pakeisti vakcinavimo nuo klasikinio infekcinio bronchito plano.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vakcinuotos vištos gali išskirti vakcininės padermės mikroorganizmus po vakcinavimo.

Vakcininės padermės mikroorganizmai gali išplisti tarp vištų. Reikia atskirti vakcinuotas ir nevakcinuotas vištas. Visos vienos vištidės vištos turi būti vakcinuotos tuo pačiu metu.

Norint išvengti vakcininės padermės mikroorganizmų išplitimo tarp imlių rūšių gyvūnų, reikėtų taikyti atitinkamas veterinarines ir gyvūnų laikymo priemones.

Ši vakcina turi būti naudojama tik nustačius, kad 2 variantas IBV yra epidemiologiškai svarbus. Reikia vengti TABic IBVAR206 vakcinos patekimo į vietas, kuriose 2 varianto IBV dar nėra.

Negalima naudoti pažeistose lizdinės plokštelės dalyse esančių tablečių.

Negalima palikti jokios nepanaudotos vakcinos dalies panaudoti kitą dieną.

Negalima naudoti per mažos dozės. Perdozuoti yra saugiau, nei duoti per mažą dozę.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės – vandeniu nelaidžios pirštinės, kaukė ir apsauginiai akiniai. Po darbo su vakcina darbuotojai turi nusiplauti rankas.

Kiaušinių dėjimas

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu ir 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima naudoti kartu su vakcinomis nuo Niukaslo ligos.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu (išskyrus pirmiau minėtas aplinkybes). Todėl sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Tyrimais patvirtinta, kad vakcina saugi net perdozavus 10 kartų.

Nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokių kitų veterinarinių vaistinių preparatų (išskyrus paminėtą skyriuje „Sąveika“).

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2023-03-06

15. KITA INFORMACIJA

Pakuotės dydis

Kartoninėje dėžutėje yra 1 arba 2 lizdinės plokštelės (10 tablečių po 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 arba 10 000 dozių).

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.