

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**Bottles****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ecomectin, 10 mg/ml, oplossing voor injectie
Ivermectinum

2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Injektionslösung enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteil:

Ivermectin 10 mg

Sonstige Bestandteile

Benzylalkohol 10 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung zur subkutanen Anwendung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

200 ml

250 ml

500 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Für Rinder, Schafe und Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Antiparasitikum für Rinder, Schafe und Schweine.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Anwendung in folgenden Dosierungen

Rinder 1,0 ml pro 50kg

Schafe 0,5 ml pro 25kg

Schweine 1,5 ml pro 50kg

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Rinder:

Essbare Gewebe: 49 Tage

Schafe:

Essbare Gewebe: 42 Tage

Schweine:

Essbare Gewebe: 28 Tage

Nicht bei Kühen oder Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist, auch nicht bei trockenstehenden Kühen und Färsen innerhalb von 60 Tagen vor dem errechneten Abkalbetermin bzw. bei Schafen innerhalb von 60 Tagen vor dem errechneten Ablammtermin.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

verwendbar bis:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis: 28 Tage

Einmal angeschnitten, verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

EXTREM GEFÄHRLICH FÜR FISCHE UND ANDERE WASSERORGANISMEN. Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

ECO Animal Health Europe Limited
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4, D04 TR29
Ireland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V261091 (Mehrdosenbehältnis aus HDPE)
BE-V661643 (Durchsichtiges PET-Mehrdosenbehältnis)

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

KARTON**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ecomectin, 10 mg/ml, oplossing voor injectie
Ivermectinum

2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Injektionslösung enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteil:
Ivermectin 10 mg
Sonstige Bestandteile
Benzylalkohol 10 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung zur subkutanen Anwendung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml
200 ml
250 ml
500 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Für Rinder, Schafe und Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**Rinder**

Zur Behandlung von Infektionen mit Magen- und Darmrundwürmern, Lungenwürmern, Augenwürmern, Dasselfliegen, Milben und Läusen bei Mastrindern und nicht laktierenden Kühen.

Schafe

Zur Behandlung der Psoroptesräude (Schafräude), Infektionen mit Magen- und Darmrundwürmern, Lungenwürmern und Nasendasseln.

Schweine

Zur Behandlung von Infektionen mit Magen- und Darmrundwürmern, Lungenwürmern, Läusen und Räudemilben.

Die empfohlene Dosis beträgt: 200 µg Ivermectin pro kg Körpergewicht bei Rindern und Schafen und 300 µg Ivermectin pro kg Körpergewicht bei Schweinen.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Anwendung in folgenden Dosierungen

Rinder 1,0 ml pro 50kg

Schafe 0,5 ml pro 25kg

Schweine 1,5 ml pro 50kg

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Rinder:

Essbare Gewebe: 49 Tage

Schafe:

Essbare Gewebe: 42 Tage

Schweine:

Essbare Gewebe: 28 Tage

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Nur zur subkutanen Injektion. Nicht intravenös oder intramuskular verabreichen.

Nicht bei Kühen oder Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist, auch nicht bei trockenstehenden Kühen und Färsen innerhalb von 60 Tagen vor dem errechneten Abkalbetermin bzw. bei Schafen innerhalb von 60 Tagen vor dem errechneten Ablammtermin.

Avermectine werden möglicherweise von anderen Tierarten schlecht vertragen. Fälle mit tödlichem Ausgang sind beim Hund, insbesondere bei Collies, Bobtails und mit ihnen verwandten Rassen und/oder Mischlingen beschrieben. Dies gilt auch für Schildkröten.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

verwendbar bis:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis: 28 Tage

Einmal angeschnitten, verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

EXTREM GEFÄHRLICH FÜR FISCH UND ANDERE WASSERORGANISMEN. Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

ECO Animal Health Europe Limited
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4, D04 TR29
Ireland

Vertrieb

Elanco Belgium
Generaal Lemanstraat 55/3
2018 Antwerpen
Belgium

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V261091 (Mehrdosenbehältnis aus HDPE)
BE-V661643 (Durchsichtiges PET-Mehrdosenbehältnis)

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.