

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Flasche mit 125 ml, 250 ml, 500 ml oder 1 Liter Inhalt****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Parofofor 140 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

140 mg Paromomycin-Base, entsprechen 200 mg Paromomycinsulfat (1:x) oder 140000 IE
Paromomycin-Aktivität**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend), Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend):
Essbare Gewebe: 20 TageSchwein:
Essbare Gewebe: 3 Tage**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Nach Anbrechen verwendbar bis
Medikiertes Trinkwasser / medikierte Milch / medikiertes Milchaustauscher müssen alle 6 Stunden (in Milch/Milchaustauscher) oder alle 24 Stunden (in Wasser) neu zubereitet oder ersetzt werden.**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Huvepharma NV

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V513840

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}