

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Etikett der Durchstechflasche 50 ml und 100 ml**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Hexasol – Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

**Wirkstoffe:**

Oxytetracyclin (als Oxytetracyclin-Dihydrat) 300 mg

Flunixin (als Flunixin Meglumin) 20 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Injektionslösung. **i.m.**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**6. VERFALLDATUM**

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Exp. {MM/JJJJ}

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern. Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Etikett der Durchstechflasche 250 ml und 500 ml**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Hexasol – Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

**Wirkstoffe:**

Oxytetracyclin (als Oxytetracyclin-Dihydrat) 300 mg

Flunixin (als Flunixin Meglumin) 20 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Injektionslösung. **i.m.**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**6. VERFALLDATUM**

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Exp. {MM/JJJJ}

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern. Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltkarton für 50 ml und 100 ml

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Hexasol – Injektionslösung

### 2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

**Wirkstoffe:**

Oxytetracyclin (als Oxytetracyclin-Dihydrat) 300 mg

Flunixin (als Flunixin Meglumin) 20 mg

### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

### 4. ZIELTIERART(EN)

Rind.

### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

-

### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Die empfohlene Dosierung beträgt 2 mg/kg Flunixin und 30 mg/kg Oxytetracyclin (entsprechend 1 ml je 10 kg Körpergewicht) als einzelne tief intramuskuläre Injektion.

Bei gleichzeitiger Verabreichung anderer Tierarzneimittel, ist eine separate Injektionsstelle zu wählen.

Maximales Volumen pro Injektionsstelle: 15 ml.

### 7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

### 8. VERFALLDATUM

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Exp. {MM/JJJJ}

### 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z.Nr.: 8-00628

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}