

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/16/0003

Avinew NEO putojošās tabletes suspensijas pagatavošanai vistām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint-Priest
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Avinew NEO putojošās tabletes suspensijas pagatavošanai vistām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena deva satur:

Dzīvs Ņūkāsas slimības vīruss, VG/GA –AVINEW celms $\geq 5,5 \log_{10} - \leq 7,0 \log_{10} \text{EID}_{50}^*$

*EID₅₀: 50 % olu inficējošā deva.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Vienu dienu vecu cāļu aktīvai imunizācijai pret Ņūkāsas slimību, lai samazinātu šīs slimības izraisīto mirstību un klīniskās pazīmes.

Imunitātes iestāšanās: 14 dienas pēc primārās vakcinācijas.

Imunitātes ilgums: līdz 6 nedēļu vecumam.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tas, kas nav minētas šajā instrukcijā, vai arī uzskatāt, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Vistas (cāļi no 1 dienas vecuma).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Primārā vakcinācija okulāri (iepilinot acī) vai okulonazāli (rupjās izsmidzināšanas metode): no vienas dienas vecuma.

Revakcinācija iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni): 2 līdz 3 nedēļu vecumā.

Starp abām vakcinācijas reizēm jābūt vismaz 2 nedēļu intervālam.

Ievadīšanas metode:

Izšķīdināt un sagatavot vakcīnu, lietojot tīru, aukstu ūdeni. Vakcīnas sagatavošanai un ievadīšanai lietot no dezinfekcijas līdzekļiem un/vai antiseptiskiem līdzekļiem brīvu aprīkojumu. Pirms vakcīnas suspensijas lietošanas nogaidīt, līdz vakcīna pilnībā izšķīst. Izšķīdinātās vakcīnas suspensija ir gaiši zilā krāsā; uz suspensijas virsmas var veidoties neliela putu kārtā.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Individuālā vakcinācija: okulārai lietošanai:

1000 putnu vakcinācijai 1000 devu tableti izšķīdināt 50 ml vārīta un atdzesēta, nehlorēta dzeramā ūdens. Nogaidīt, līdz tablete pilnībā izšķīst, un tad ar šļirci suspensiju pārnest pilinātājā.

Lietot kalibrētu pilinātāju, kas veido 50 µl pilienus. Katram putnam konjunktīvā iepilināt vienu vakcīnas pilienu, nogaidīt līdz piliens izplatās, tad putnu atbrīvot.

Masveida ganāmpulka vakcinācija: iekšķīgai lietošanai:

1000 putnu vakcinācijai 1000 devu tableti izšķīdināt 50 ml nehlorēta dzeramā ūdens un pievienot tādām ūdens daudzumam, ko putni var uzņemt vienas līdz divu stundu laikā.

Lai neitralizētu hlora paliekas, pirms vakcīnas tabletes izšķīdināšanas, dzeramajam ūdenim pievienot sauso vājpiena pulveri 2,5 g / litrā ūdens.

Divas stundas pirms vakcinācijas pārtraukt dzeramā ūdens padevi putniem.

Masveida vakcinācija: vakcinācija ar rupjās izsmidzināšanas metodi:

1000 putnu vakcinācijai 3 - 5 ml vārīta un atdzesēta, nehlorēta dzeramā ūdens izšķīdināt 1000 devu tableti. Pēc tam izšķīdināt to tādā vārītā un atdzesētā, nehlorētā dzeramā ūdens tilpumā atbilstoši lietojamā izsmidzinātāja tipam (spiediena izsmidzinātājs vai izsmidzinātājs ar rotējošu konusu).

Izsmidzināt vakcīnas suspensiju virs putniem, lietojot izsmidzinātāju, kas veido mikropilienu, 80 – 100 µm diametrā.

Lai nodrošinātu atbilstošu vakcīnas izplatīšanos, jāpārlicinās, ka putni ir cieši norobežoti vakcinācijas laikā.

Putnu mītnes ventilācijas sistēmai izsmidzināšanas laikā jābūt izslēgtai.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2 C - 8°C).

Pēc atšķaidīšanas izlietot 2 stundu laikā.

Neuzglabāt no blistera izņemtās neizlietotās tabletes.

Uzglabāt ārējā iepakojumā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc “EXP”.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Vakcīnas vīruss var izplatīties uz nevakcinētiem putniem. Nevakcinētu putnu inficēšanās ar vakcīnas vīrusu no vakcinētiem putniem neuzrāda nekādas slimības pazīmes. Virulences reversijas laboratoriskie pētījumi parādīja, ka vakcīnas vīruss neiegūst nekādas patogēnas pazīmes pēc 10 pasāžām cāļos. Tāpēc izplatīšanās uz nevakcinētiem putniem, cik šobrīd zināms, uzskatāma par drošu.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Rīkojoties ar lietošanai sagatavoto vakcīnu, ievērot piesardzības pasākumus.

Tā kā Ņūkāsas slimības vīruss cilvēkiem var izraisīt īslaicīgu konjunktivītu, rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, jāizmanto individuālais aizsargtērps, kas sastāv no respiratora un brillēm.

Pēc vakcinācijas mazgāt un dezinficēt rokas.

Dēšanas periods:

Nevakcinēt putnus dēšanas periodā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pēc desmitkārtīgas vakcīnas devas ievadīšanas, netika novērotas blakusparādības.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

Dezinfektantu un/vai antiseptisko līdzekļu klātbūtne ūdenī un materiālos, kas tiek lietoti vakcīnas suspensijas sagatavošanai, nav savienojama ar efektīvu vakcināciju.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

ATŶvet kods: QI01AD06.

Vakcīna satur dzīvu Ņūkāslas slimības vīrusu, VG/GA-AVINEW celmu. VG/GA-AVINEW celms ir lentogēns un dabīgi apatogēns cāļiem (genotips I klase II). Vakcīna izraisa aktīvu imunizāciju pret Ņūkāslas slimību, kas pierādīts provokācijas pētījumos broilera cāļiem.

Kaste ar 1 vai 10 blisteriem, satur 10 tabletes 1000 devām.

Kaste ar 1 vai 10 blisteriem, satur 10 tabletes 2000 devām.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Ražoti izmantojot tehnoloģiju licenci no Phibro Animal Health Corporation USA filiāles.