

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

20 ali 72 injektorjev in čistilnih robčkov

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Seclaris DC 250 mg intramamarna suspenzija za krave v presušitvi
Cefalonij (v obliki cefalonijevega dihidrata)

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Vsak 3g intramamarni injektor vsebuje 250 mg cefalonija (v obliki cefalonijevega dihidrata).

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarna suspenzija.

4. VELIKOST PAKIRANJA

20 injektorjev + čistilnih robčkov
72 injektorjev + čistilnih robčkov

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v presušitvi).

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Intramamarna uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA**Karenca:**

Meso in organi: 21 dni

Mleko: 96 ur po telitvi, če je bilo obdobje presušitve daljše od 54 dni.

58 dni po zdravljenju, če je bilo obdobje presušitve krajše ali enako 54 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Penicilini in cefalosporini lahko občasno povzročijo resne alergične reakcije.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo za opozorila uporabnikom.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo uporabite takoj.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
--

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Ceva Santé Animale
10, avenue de La Ballastière
33500 Libourne
Francija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0592/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Injektor 3 g

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Seclaris DC 250 mg intramamarna suspenzija za krave v presušitvi
Cefalonij (v obliki cefalonijevega dihidrata)

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

Cefalonij (v obliki cefalonijevega dihidrata): 250 mg

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

3 g

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramamarna uporaba.

5. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 21 dni

Mleko: 96 ur po telitvi, če je bilo obdobje presušitve daljše od 54 dni.

58 dni po zdravljenju, če je bilo obdobje presušitve krajše ali enako 54 dni.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.