

**LISA I**  
**RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE**

## 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

EVICTO 15 mg täpilahus kassidele ja koertele ≤2,5 kg  
EVICTO 30 mg täpilahus koertele 2,6–5,0 kg  
EVICTO 45 mg täpilahus kassidele 2,6–7,5 kg  
EVICTO 60 mg täpilahus kassidele 7,6–10,0 kg  
EVICTO 60 mg täpilahus koertele 5,1–10,0 kg  
EVICTO 120 mg täpilahus koertele 10,1–20,0 kg  
EVICTO 240 mg täpilahus koertele 20,1–40,0 kg  
EVICTO 360 mg täpilahus koertele 40,1–60,0 kg

## 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga üksikannus (pipett) sisaldab:

### Toimeaine:

|                                    |                 |                            |        |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| EVICTO 15 mg kassidele ja koertele | 60 mg/ml lahus  | selamektiin (selamectinum) | 15 mg  |
| EVICTO 30 mg koertele              | 120 mg/ml lahus | selamektiin                | 30 mg  |
| EVICTO 45 mg kassidele             | 60 mg/ml lahus  | selamektiin                | 45 mg  |
| EVICTO 60 mg kassidele             | 60 mg/ml lahus  | selamektiin                | 60 mg  |
| EVICTO 60 mg koertele              | 120 mg/ml lahus | selamektiin                | 60 mg  |
| EVICTO 120 mg koertele             | 120 mg/ml lahus | selamektiin                | 120 mg |
| EVICTO 240 mg koertele             | 120 mg/ml lahus | selamektiin                | 240 mg |
| EVICTO 360 mg koertele             | 120 mg/ml lahus | selamektiin                | 360 mg |

### Abiaine:

Butüülhüdrosütolueen 0,8 mg/ml.

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

## 3. RAVIMVORM

Täpilahus.

Värvitu kuni kollane lahus.

## 4. KLIINILISED ANDMED

### 4.1 Loomaliigid

Koer, kass.

### 4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

#### Kass, koer

- *Ctenocephalides* spp. põhjustatud **kirbuinfestatsiooni ravi ja tõrje** ühe kuu jooksul pärast veterinaarravimi ühekordset manustamist. Selle veterinaarravimi toimetel hukuvad kirpude täiskasvanud vormid, munad ja vastsed. Veterinaarravimi kirbumunade vastane toime kestab kuni 3 nädalat pärast manustamist. Kirbupopulatsiooni vähendades aitab igakuine manustamine tiinetele ja lakteerivatele loomadele ära hoida kirbuinfestatsiooni kutsikatel kuni seitsmenda elunädalani. Veterinaarravimit võib kasutada ühe komponendina kirbuallergiast tingitud

dermatiidi ravis ning kirbumune ja -vastseid hävitavate omaduste tõttu võib see aidata kontrollida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas keskkonnas.

- *Dirofilaria immitis*'e põhjustatud **südameusstõve ennetamine** veterinaarravimi igakuise manustamisega. Ravim on ohutu manustamiseks täiskasvanud südameussidega nakatunud loomadele. Siiski on kooskõlas hea loomaarstliku tavaga soovitatav, et kõiki loomi, kes on vanemad kui kuus kuud ja elavad maades, kus eksisteerib *Dirofilaria immitis*'e siirutaja, kontrollitaks täiskasvanud südameusside infektsiooni suhtes enne ravi selle ravimiga. Südameusstõve tõrje osana on soovitatav, et koeri kontrollitaks perioodiliselt selle infektsiooni suhtes ka siis, kui ravimit on manustatud iga kuu. Preparaat ei toimi *Dirofilaria immitis*'e täiskasvanud vormide vastu.
- **Kuulmelestade** (*Otodectes cynotis*) põhjustatud parasitoosi **ravi**.

#### Kass

- Täiinfestatsioonide (*Felicola subrostratus*) ravi.
- Ümarusside (*Toxocara cati*) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.
- Soole nugiussi (*Ancylostoma tubaeforme*) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.

#### Koer

- Täiinfestatsioonide (*Trichodectes canis*) ravi.
- Süüdiklesta (*Sarcoptes scabiei*) infestatsiooni ravi.
- Ümarusside (*Toxocara canis*) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.

### 4.3 Vastunäidustused

Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel loomadel.

Mitte kasutada kassidel, kes põevad veel mõnda haigust, on kurtunud või alakaalulised.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

### 4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Loomade pesemine kaks või enam tundi pärast preparaadi manustamist ei vähenda selle efektiivsust.

Mitte manustada märja karvastikuga loomadele. Siiski ei vähenda looma vee või šampooniga pesemine 2 tundi või rohkem pärast ravimi manustamist selle tõhusust.

Kuulmelestadest põhjustatud parasitoosi raviks mitte manustada otse kuulmekäiku.

### 4.5 Ettevaatusabinõud

#### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Veterinaarravim on mõeldud ainult naha pinnale manustamiseks. Mitte manustada suukaudselt või parenteraalselt.

Hoida ravitud loomi vähemalt 30 minutit pärast preparaadi manustamist või karvastiku kuivamiseni eemal lahtisest tulest või teistest süüteallikatest.

Ravimi äralakkumise vältimiseks on tähtis manustada ravimit täpselt juhendi järgi. Kassidel võib pärast veterinaarravimi lakkumist esineda harva lühike hüpersalivatsiooni periood.

#### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Veterinaarravim on kergsüttiv: hoida eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest tulest ja teistest süüteallikatest.

Ärge suitsetage, sööge ega jooge ravimi käsitlemise ajal.

Ravim võib põhjustada naha ja silmade ärritust. Kohe pärast veterinaarravimi kasutamist peske käed ja ravimiga kokkupuutunud nahk põhjalikult seebi ning veega. Preparaadi juhuslikul sattumisel silma loputada silmi kohe veega ja pöörduda viivitamatult arsti poole ning näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Vältida otsest kokkupuudet ravitud loomadega kuni manustamiskoha kuivamiseni. Ravipäeval ei tohi lapsed ravitud loomi katsuda ja loomad ei tohi magada omanike, eriti laste juures. Kasutatud pakendid tuleb kohe ära visata ja mitte jätta lastele kättesaadavasse või nähtavasse kohta.

Tundliku nahaga või seda tüüpi veterinaarravimite suhtes teadaoleva allergiaga inimesed peaksid seda ravimit käsitlema ettevaatlikult.

#### Muud ettevaatusabinõud

Ravitud loomi ei tohi lubada veekogudesse kuni kaks tundi pärast preparaadi manustamist.

### **4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)**

Veterinaarravimi kasutamisel kassidel on harvadel juhtudel esinenud manustamiskohal kerget mööduvat alopeetsiat. Väga harva on esinenud mööduvat paikset ärritust. Alopeetsia ja ärritus mööduvad tavaliselt iseenesest, kuid mõningatel juhtudel võib vaja olla sümptomaatilist ravi.

Harva on täheldatud manustamiskohal karvade mööduvat kokkukleepumist ja/või väikese koguse valge pulbri esinemist. See on normaalne ja kaob tavaliselt 24 tunni jooksul ega mõjuta veterinaarravimi ohutust ja toimet.

Veterinaarravimi lakkumise järel võib kassidel harva esineda lühike hüpersalivatsiooni periood.

Nagu ka teiste makrotsükliliste laktoonide puhul, on pärast veterinaarravimi kasutamist nii kassidel kui ka koertel väga harva täheldatud pöörduvaid neuroloogilisi nähte, sealhulgas krampihoogusid.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1 loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st ravitud loomast, sealhulgas üksikjuhud).

### **4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil**

Ravimit on lubatud kasutada aretuses kasutatavatel, tiinetel ja lakteerivatel kassidel ning koertel.

### **4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed**

Ei ole teada.

### **4.9 Annustamine ja manustamisviis**

Ravimit manustatakse ühekordse annusena, manustades minimaalselt 6 mg/kg selamektiini. Kui veterinaarravimiga ravitakse samal loomal mitmeid kaasuvaid infestatsioone või infektsioone, tuleb veterinaarravimit korraga manustada ainult üks kord soovitatavalt 6 mg/kg annusena. Individuaalsete parasitooside raviperioodi kestus on toodud allpool.

Manustada tabeli järgi:

| Kass (kg) | Ravim                                               | Manustatav selamektiini kogus (mg) | Tugevus (mg/ml) | Manustatav kogus (pipeti suurus, ml) |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| ≤ 2,5     | 1 pipett Evicto 15 mg kassidele ja koertele ≤2,5 kg | 15                                 | 60              | 0,25                                 |
| 2,6–7,5   | 1 pipett Evicto 45 mg kassidele 2,6...7,5 kg        | 45                                 | 60              | 0,75                                 |
| 7,6–10,0  | 1 pipett Evicto 60 mg kassidele 7,6...10 kg         | 60                                 | 60              | 1,0                                  |
| > 10      | Sobiv pipettide kombinatsioon                       | Sobiv pipettide kombinatsioon      | 60              | Sobiv pipettide kombinatsioon        |

| Koer (kg) | Ravim                                               | Manustatav selamektiini kogus (mg) | Tugevus (mg/ml) | Manustatav kogus (pipeti suurus, ml) |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| ≤ 2,5     | 1 pipett Evicto 15 mg kassidele ja koertele ≤2,5 kg | 15                                 | 60              | 0,25                                 |
| 2,6–5,0   | 1 pipett Evicto 30 mg koertele 2,6...5 kg           | 30                                 | 120             | 0,25                                 |
| 5,1–10,0  | 1 pipett Evicto 60 mg koertele 5,1...10 kg          | 60                                 | 120             | 0,5                                  |
| 10,1–20,0 | 1 pipett Evicto 120 mg koertele 10,1...20 kg        | 120                                | 120             | 1,0                                  |
| 20,1–40,0 | 1 pipett Evicto 240 mg koertele 20,1...40 kg        | 240                                | 120             | 2,0                                  |
| 40,1–60,0 | 1 pipett Evicto 360 mg koertele 40,1...60 kg        | 360                                | 120             | 3,0                                  |
| > 60      | Sobiv pipettide kombinatsioon                       | Sobiv pipettide kombinatsioon      | 60/120          | Sobiv pipettide kombinatsioon        |

### Kirbuinfestatsiooni ravi ja tõrje (kassid ja koerad)

Veterinaarravimi manustamise järel hukuvad loomal olevad täiskasvanud kirbud, eluvõimelisi mune ei toodeta ning (ainult keskkonnas leiduvad) vastsed hukuvad. See peatab kirpude paljunemise, katkestab nende arengutsükli ja võib aidata kontrollida kirpude esinemist loomaga kokkupuutavas keskkonnas.

Kirbuinfestatsiooni profülaktikaks tuleb veterinaarravimit manustada ühekuulise intervalliga kogu kirbuhooaja jooksul, alustades kuu aega enne kirpude aktiveerumist. Kirbupopulatsiooni vähendades aitab igakuine manustamine tiinetele ja lakteerivatele loomadele ära hoida kirbuinfestatsiooni kutsikatel kuni seitsmenda elunädalani.

Osana kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi ravis peab veterinaarravimit manustama ühekuulise intervalliga.

### Südameusstõve ennetamine (kassid ja koerad)

Veterinaarravimit võib manustada aasta ringi või vähemalt ühe kuu vältel pärast looma esimest kokkupuudet sääskedega ning seejärel iga kuu kuni sääsehooaja lõpuni.

Viimane annus tuleb manustada ühe kuu vältel pärast viimast kokkupuudet sääskedega. Kui üks manustamiskord jääb vahele ja manustamisintervall on pikem kui üks kuu, vähendab kohene preparaadi manustamine ja igakuise raviskeemi taasalustamine täiskasvanud usside arenguvõimalusi. Ühe südameusstõve ennetava preparaadi asendamisega tuleb esimene annus manustada ühe kuu jooksul pärast eelmise ravimi viimase annuse manustamist.

### Ümarusside põhjustatud parasitooside ravi (kassid ja koerad)

Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

### **Täiinfestatsiooni ravi (kassid ja koerad)**

Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

### **Kuulmelestade põhjustatud parasitoosi ravi (kassid)**

Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

### **Kuulmelestade põhjustatud parasitoosi ravi (koerad)**

Manustatakse üks annus veterinaarravimit. Ravimi manustamisel tuleb lahtine mustus välisest kuulmekäigust õrnalt eemaldada. 30 päeva pärast ravi on soovitatav teha uus veterinaarne läbivaatus, sest mõned loomad võivad vajada teistkordset ravi.

### **Soole nugiusside põhjustatud parasitoosi ravi (kassid)**

Manustatakse üks annus veterinaarravimit.


### **Süüdiklesta põhjustatud parasitoosi ravi (koerad)**

Lestade täielikuks hävitamiseks manustatakse üks annus veterinaarravimit kahel järjestikusel kuul.

#### Manustamisviis ja -tee

Täppmanustamine.

Manustada nahale kaela alumises osas abaluude ees.



#### Manustamine

Võtke ravimi pipett kaitsvast pakendist välja.

1. Hoides pipetti püstises asendis, eemaldage sellelt kork.

2. Keerake kork tagurpidi ja asetage ülemine ots allpool uuesti aplikaatori otsale. Suruge korki allapoole aplikaatori kaitsme purunemiseni.

Eemaldage kork vahetult enne ravimi manustamist.

3. Suruge karv looma kaela alumises osas abaluude ees lahku ja paljastage nahk.

Asetage ravimi pipeti tipp otse vastu nahka. Ärge masseerige.

Pigistage pipetti tugevasti, tühjendades selle sisu ühte punkti. Vältige ravimi sattumist sõrmedele.

Mitte manustada märja karvastikuga loomadele. Siiski ei vähenda looma vee või šampooniga pesemine 2 tundi või rohkem pärast ravimi manustamist selle efektiivsust.

#### **4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):**

selamektiini manustamisel kümnekordses soovitatavas annuses kõrvatoimeid ei esinenud. Selamektiini manustamisel täiskasvanud südameussidega nakatunud kassidele ja koertele kolmekordses soovitatavas annuses kõrvatoimeid ei esinenud. Selamektiini manustamisel kolmekordses soovitatavas annuses aretuses kasutatavatele isastele ja emastele koertele ning

kassidele, sealhulgas tiinetele ja lakteerivatele, järglasi imetavatele emasloomadele, ja viiekordses annuses ivermektini suhtes tundlikele kollidele, kõrvaltoimeid ei esinenud.

#### **4.11 Keeluaeg (-ajad)**

Ei rakendata.

### **5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED**

Farmakoterapeutiline rühm: parasiitide vastased ained, insektitsiidid ja repellendid, makrotsükliilised laktoonid.

ATCvet kood: QP54AA05.

#### **5.1 Farmakodünaamilised omadused**

Selamektiin on poolsünteetiline avermektiinide rühma kuuluv aine. Selamektiin halvab ja/või tapab paljusid selgrootuid parasiite, takistades nende kloorikanalite juhtivust ja põhjustades normaalse neurotransmissiooni katkemise. See inhibeerib nematoodidel närvirakkude ja artropoodidel lihasrakkude elektrilist aktiivsust, viies nende halvatusse ja/või surmani.

Selamektiinil on täiskasvanud kirpe, kirbuvastseid ja mune hävitav toime. Seetõttu katkestab see efektiivselt kirbu arengutsükli, tappes täiskasvanud kirbud (loomal), hoides ära vastsete kooremise munadest (loomal ja keskkonnas) ning hävitades vastsevormid (ainult keskkonnas). Selamektiiniga ravitud loomadelt pärinev materjal hävitab kirbumunad ja vastsed, mis ei ole varem selamektiiniga kokku puutunud, aidates sellega kontrolli all hoida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas keskkonnas.

Tõestatud on ka selamektiini toime südameusside vastsete vastu.

#### **5.2 Farmakokineetilised andmed**

Pärast täppmanustamist imendub selamektiin nahalt ja saavutab maksimaalse plasmakontsentratsiooni kassidel umbes ühe päeva ja koertel umbes kolm päeva pärast manustamist.

Pärast nahalt imendumist jaotub selamektiin süsteemselt ja eritub plasmast aeglaselt, nagu võib näha jälgitavatest plasmakontsentratsioonidest 30 päeva pärast ühekordset paikset manustamist koertele ja kassidele annuses 6 mg/kg. Selamektiini pikendatud toimeaeg ja aeglane eritumine plasmast väljenduvad lõplikus poolestusajas, mis on kassidel 8 päeva ja koertel 11 päeva. Selamektiini süsteemne püsimine plasmas ja ekstensiivse metabolismi puudumine tagavad selamektiini efektiivse kontsentratsiooni 30-päevase annustamisintervalli puhul.

### **6. FARMATSEUTILISED ANDMED**

#### **6.1 Abiainete loetelu**

Butüülhüdroksütolueen  
Dipropüleenglükoolmetüüleeter  
Isopropüülalkohol

#### **6.2 Sobimatus**

Ei rakendata.

#### **6.3 Kõlblikkusaeg**

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

#### **6.4. Säilitamise eritingimused**

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Säilitada kinnises pakendis kuivas kohas kaitsmaks valguse ja niiskuse eest.

#### **6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis**

Ravim on müügil 1, 4 ja 24 pipetti sisaldavate pakenditena (kõik pipeti suurused). Veterinaarravim on pakendatud alumiiniumümbrises poolläbipaistvatesse polüpropüleenist üheannuselistesse pipettidesse.

1 Evicto 15 mg pipett kassidele ja koertele sisaldab 0,25 ml 60 mg/ml lahust.

1 Evicto 45 mg pipett kassidele sisaldab 0,75 ml 60 mg/ml lahust.

1 Evicto 60 mg pipett kassidele sisaldab 1,0 ml 60 mg/ml lahust.

1 Evicto 30 mg pipett koertele sisaldab 0,25 ml 120 mg/ml lahust.

1 Evicto 60 mg pipett koertele sisaldab 0,5 ml 120 mg/ml lahust.

1 Evicto 120 mg pipett koertele sisaldab 1,0 ml 120 mg/ml lahust.

1 Evicto 240 mg pipett koertele sisaldab 2,0 ml 120 mg/ml lahust.

1 Evicto 360 mg pipett koertele sisaldab 3,0 ml 120 mg/ml lahust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

#### **6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel**

Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Ravimit ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Pakendid ja jäätmematerjal tuleb veekogudesse sattumise vältimiseks hävitada koos kodumajapidamises tekkivate jäätmetega.

### **7. MÜÜGILOA HOIDJA**

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prantsusmaa

### **8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

EU/2/1/19/242/001-024

### **9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV**

Esmase müügiloe väljastamise kuupäev: 19/07/19

### **10 TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV**

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Raviameti koduleheküljelt <http://www.ema.europa.eu/>.



## **MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD**

Ei rakendata.

## **LISA II**

- A. RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA**
- B. TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD**
- C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID**
- D. MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE**

**A. RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA**

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prantsusmaa

**B. TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD**

Retseptiravim.

**C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID**

Ei kohaldata.

**D. MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE**

Ravimiohutuse järelevalve nõuded:

Ravimi perioodiliste ohutusaruannete (PSUR) esitamine sünkroonitakse võrdlusravimiga.

**III LISA**  
**PAKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT**

## **A. PAKENDI MÄRGISTUS**

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED****Kartongkarp 15 mg (1, 4 ja 24 pipetti)****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

EVICTO 15 mg täpilahus kassidele ja koertele ≤2,5 kg  
Selamectinum

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

Selamektiin 15 mg

**3. RAVIMVORM**

Täpilahus.

**4. PAKENDI SUURUS(ED)**

1 pipett  
4 pipetti  
24 pipetti

x 0,25 ml

**5. LOOMALIIGID**

Kass, koer

**6. NÄIDUSTUS(ED)****7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Täppmanustamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAEG****9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP {kuu, aasta}

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida kinnises originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED  
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON  
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

**14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

VIRBAC  
1ère avenue – 2065 m – LID  
06516 Carros  
Prantsusmaa

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

EU/2/19/242/001  
EU/2/19/242/002  
EU/2/19/242/003

**17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER**

Lot {number}

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED****KARTONGKARP 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (1, 4 JA 24 PIPETTI)****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Evicto 30 mg täpilahus koertele 2,6–5,0 kg

Evicto 60 mg täpilahus koertele 5,1–10,0 kg

Evicto 120 mg täpilahus koertele 10,1–20,0 kg

Evicto 240 mg täpilahus koertele 20,1–40,0 kg

Evicto 360 mg täpilahus koertele 40,1–60,0 kg

Selamectinum

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

Selamektiin 30 mg

Selamektiin 60 mg

Selamektiin 120 mg

Selamektiin 240 mg

Selamektiin 360 mg

**3. RAVIMVORM**

Täpilahus.

**4. PAKENDI SUURUS(ED)**

1 pipett

4 pipetti

24 pipetti

x 0,25 ml

x 0,5 ml

x 1,0 ml

x 2,0 ml

x 3,0 ml

**5. LOOMALIIGID**

Koer

**6. NÄIDUSTUS(ED)****7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Täppmanustamine.



Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAEG**

**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP {kuu, aasta}

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida kinnises originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED  
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON  
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

**14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

VIRBAC  
1ère avenue – 2065 m – LID  
06516 Carros  
Prantsusmaa

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

EU/2/19/242/010

EU/2/19/242/011

EU/2/19/242/012

EU/2/19/242/013

EU/2/19/242/014  
EU/2/19/242/015

EU/2/19/242/016  
EU/2/19/242/017  
EU/2/19/242/018

EU/2/19/242/019  
EU/2/19/242/020  
EU/2/19/242/021

EU/2/19/242/022  
EU/2/19/242/023  
EU/2/19/242/024

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER</b> |
|---------------------------------------|

Lot {number}

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARTONGKARP 45 mg, 60 mg (1, 4 JA 24 PIPETTI)

### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Evicto 45 mg täpilahus kassidele 2,6–7,5 kg  
Evicto 60 mg täpilahus kassidele 7,6–10,0 kg  
Selamectinum

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Selamektiin 45 mg  
Selamektiin 60 mg

### 3. RAVIMVORM

Täpilahus.

### 4. PAKENDI SUURUS(ED)

1 pipett  
4 pipetti  
24 pipetti

x 0,75 ml  
x 1,0 ml

### 5. LOOMALIIGID

Kass

### 6. NÄIDUSTUS(ED)

### 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 8. KEELUAEG

### 9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP {kuu, aasta}

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida kinnises originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED  
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON  
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

**14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

VIRBAC  
1ère avenue – 2065 m – LID  
06516 Carros  
Prantsusmaa

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

EU/2/19/242/004  
EU/2/19/242/005  
EU/2/19/242/006

EU/2/19/242/007  
EU/2/19/242/008  
EU/2/19/242/009

**17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER**

Lot {number}

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

Ümbrise 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

EVICTO 15 mg täpilahus kassidele ja koertele  $\leq 2,5$  kg

Evicto 30 mg täpilahus koertele 2,6–5,0 kg

Evicto 45 mg täpilahus kassidele 2,6–7,5 kg

Evicto 60 mg täpilahus kassidele 7,6–10,0 kg

Evicto 60 mg täpilahus koertele 5,1–10,0 kg

Evicto 120 mg täpilahus koertele 10,1–20,0 kg

Evicto 240 mg täpilahus koertele 20,1–40,0 kg

Evicto 360 mg täpilahus koertele 40,1–60,0 kg



Selamectinum

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

15 mg selamektiini

30 mg selamektiini

45 mg selamektiini

60 mg selamektiini

120 mg selamektiini

240 mg selamektiini

360 mg selamektiini

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

**4. MANUSTAMISVIIS(ID)**

Täppmanustamine.

**5. KEELUAEG**

**6. PARTII NUMBER**

Lot {number}

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP {kuu, aasta}

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”</b> |
|------------------------------------------------------|

Ad us. vet.

## **B. PAKENDI INFOLEHT**

## PAKENDI INFOLEHT

### Evicto täpilahus

#### 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA ADDRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prantsusmaa

#### 2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Evicto 15 mg täpilahus kassidele ja koertele ≤ 2,5 kg

Evicto 30 mg täpilahus koertele 2,6–5,0 kg

Evicto 45 mg täpilahus kassidele 2,6–7,5 kg

Evicto 60 mg täpilahus kassidele 7,6–10,0 kg

Evicto 60 mg täpilahus koertele 5,1–10,0 kg

Evicto 120 mg täpilahus koertele 10,1–20,0 kg

Evicto 240 mg täpilahus koertele 20,1–40,0 kg

Evicto 360 mg täpilahus koertele 40,1–60,0 kg

Selamektiin (Selamectinum)

#### 3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga üksikannus (pipett) sisaldab:

|                                    |                 |                    |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| EVICTO 15 mg kassidele ja koertele | 60 mg/ml lahus  | selamektiin 15 mg  |
| EVICTO 30 mg koertele              | 120 mg/ml lahus | selamektiin 30 mg  |
| EVICTO 45 mg kassidele             | 60 mg/ml lahus  | selamektiin 45 mg  |
| EVICTO 60 mg kassidele             | 60 mg/ml lahus  | selamektiin 60 mg  |
| EVICTO 60 mg koertele              | 120 mg/ml lahus | selamektiin 60 mg  |
| EVICTO 120 mg koertele             | 120 mg/ml lahus | selamektiin 120 mg |
| EVICTO 240 mg koertele             | 120 mg/ml lahus | selamektiin 240 mg |
| EVICTO 360 mg koertele             | 120 mg/ml lahus | selamektiin 360 mg |

##### Abiained:

Butüülhüdroksütolueen 0,8 mg/ml.

Värvitu kuni kollane lahus.

#### 4. NÄIDUSTUS(ED)

##### Kass ja koer

- *Ctenocephalides* spp. põhjustatud kirbuinfestatsiooni ravi ja tõrje ühe kuu jooksul pärast ravimi ühekordset manustamist. Selle ravimi toimet hukkuvad kirpude täiskasvanud vormid, munad ja



vastsed. Ravimi kirbumunade vastane toime kestab kuni 3 nädalat pärast manustamist. Kirbupopulatsiooni vähendades aitab igakuine manustamine tiinetele ja lakteerivatele loomadele ära hoida kirbuinfestatsiooni kutsikatel kuni seitsmenda elunädalani. Veterinaarravimit võib kasutada ühe komponendina kirbuallergiast tingitud dermatiidi ravis ning tänu kirbumune ja -vastseid tapvatele omadustele võib see aidata kontrollida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas keskkonnas

- *Dirofilaria immitis*'e põhjustatud **südameusstõve ennetamine** veterinaarravimi igakuise manustamisega. Ravim on ohutu manustamiseks täiskasvanud südameussidega nakatunud loomadele. Siiski on kooskõlas hea loomaarstliku tavaga soovitatav, et kõiki loomi, kes on vanemad kui kuus kuud ja elavad piirkondades, kus eksisteerib *Dirofilaria immitis*'e siirutaja, kontrollitaks osana südameusstõve tõrjestrategiast regulaarselt täiskasvanud südameusside infektsiooni suhtes, ka siis, kui ravimit on manustatud iga kuu. See veterinaarravim ei toimi *Dirofilaria immitis*'e täiskasvanud vormide vastu.

- **Kuulmelestade** (*Otodectes cynotis*) põhjustatud parasitoosi ravi.

#### Kass

- Täiinfestatsioonide (*Felicola subrostratus*) ravi.
- Ümarusside (*Toxocara cati*) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.
- Soole nugiussi (*Ancylostoma tubaeforme*) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.

#### Koer

- Täiinfestatsiooni (*Trichodectes canis*) ravi
- Süüdiklesta (*Sarcoptes scabiei*) põhjustatud parasitoosi ravi
- Ümarusside (*Toxocara canis*) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.

## 5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel loomadel. Mitte kasutada kassidel, kes põevad veel mõnda haigust, on kurtunud või alakaalulised. Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

## 6. KÕRVALTOIMED

Veterinaarravimi kasutamisel kassidel on harvadel juhtudel esinenud manustamiskohal kerget mööduvat alopeetsiat. Väga harva on esinenud mööduvat paikset ärritust. Alopeetsia ja ärritus mööduvad tavaliselt iseenesest, kuid mõningatel juhtudel võib vaja olla sümptomaatilist ravi.

Harvadel juhtudel võib kassidel ja koertel veterinaarravimi manustamiskohal esineda karvade kokkukleepumist ja/või vähese koguse valge pulbri ilmutumist. See on normaalne ja kaob tavaliselt 24 tunni jooksul, mõjutamata veterinaarravimi ohutust ja toimet.

Veterinaarravimi lakkumise järel võib kassidel harva esineda lühike hüpersalivatsiooni periood.

Nagu ka teiste makrotsükliliste laktoonide puhul, on pärast veterinaarravimi kasutamist nii kassidel kui ka koertel väga harva täheldatud pöörduvaid neuroloogilisi nähte, sealhulgas krambihoogusid.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1 loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st ravitud loomast, sealhulgas üksikjuhud).

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## 7. LOOMALIIGID

Kass ja/või koer.

## 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Täppmanustamine.

Manustada nahale kaela alumises osas abaluude ees.

Ravimit manustatakse paikset ühekordse annusena, manustades minimaalselt 6 mg/kg selamektiini. Kui veterinaarravimiga ravitakse samal loomal mitmeid kaasuvaid infestatsioone või infektsioone, tuleb veterinaarravimit korraga manustada ainult üks kord soovitatavalt 6 mg/kg annusena. Individuaalsete parasitooside raviperioodi kestus on toodud allpool.

Manustada ravimit tabeli järgi:

| Kass (kg) | Ravim                                               | Manustatav selamektiini kogus (mg) | Tugevus (mg/ml) | Manustatav kogus (pipeti suurus, ml) |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| ≤ 2,5     | 1 pipett Evicto 15 mg kassidele ja koertele ≤2,5 kg | 15                                 | 60              | 0,25                                 |
| 2,6–7,5   | 1 pipett Evicto 45 mg kassidele 2,6...7,5 kg        | 45                                 | 60              | 0,75                                 |
| 7,6–10,0  | 1 pipett Evicto 60 mg kassidele 7,6...10 kg         | 60                                 | 60              | 1,0                                  |
| > 10      | Sobiv pipettide kombinatsioon                       | Sobiv pipettide kombinatsioon      | 60              | Sobiv pipettide kombinatsioon        |

| Koer (kg) | Ravim                                               | Manustatav selamektiini kogus (mg) | Tugevus (mg/ml) | Manustatav kogus (pipeti suurus, ml) |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| ≤ 2,5     | 1 pipett Evicto 15 mg kassidele ja koertele ≤2,5 kg | 15                                 | 60              | 0,25                                 |
| 2,6–5,0   | 1 pipett Evicto 30 mg koertele 2,6...5 kg           | 30                                 | 120             | 0,25                                 |
| 5,1–10,0  | 1 pipett Evicto 60 mg koertele 5,1...10 kg          | 60                                 | 120             | 0,5                                  |
| 10,1–20,0 | 1 pipett Evicto 120 mg koertele 10,1...20 kg        | 120                                | 120             | 1,0                                  |
| 20,1–40,0 | 1 pipett Evicto 240 mg koertele 20,1...40 kg        | 240                                | 120             | 2,0                                  |
| 40,1–60,0 | 1 pipett Evicto 360 mg koertele 40,1...60 kg        | 360                                | 120             | 3,0                                  |
| > 60      | Sobiv pipettide kombinatsioon                       | Sobiv pipettide kombinatsioon      | 60/120          | Sobiv pipettide kombinatsioon        |

### Kirbuinfestatsiooni ravi ja tõrje (kass ja koer)

Üle 6 nädala vanused loomad

Veterinaarravimi loomale manustamise järel hukkuvad täiskasvanud kirbud ja vastsed ning eluvõimelisi mune ei toodeta. See peatab kirpude paljunemise ja võib aidata kontrollida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuv keskkonnas.

Kirbuinfestatsiooni profülaktikaks tuleb veterinaarravimit manustada ühekuulise intervalliga kogu kirbuhooaja jooksul, alustades kuu aega enne kirpude aktiveerumist. See kindlustab loomal olevate täiskasvanud kirpude hukkumise, eluvõimeliste munade tootmise katkemise ja (ainult keskkonnas leiduvate) vastsete hukkumise. See katkestab kirpude arengutsükli ja aitab ära hoida kirbuinfestatsiooni.

Osana kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi ravis peab veterinaarravimit manustama ühekuulise intervalliga.

#### Tiinete ja imetavate loomade ravi kutsikate ja kassipoegade kirbuinfestatsiooni ennetamiseks

Kirbupopulatsiooni vähendamiseks aitab igakuine manustamine tiinetele ja lakteerivatele loomadele hoida ära kirbuinfestatsiooni kutsikatel kuni seitsmenda elunädalani.

#### **Südameusstõve ennetamine (kass ja koer)**

Veterinaarravimit võib manustada aasta ringi või vähemalt ühe kuu vältel pärast looma esimest kokkupuudet sääskedega ning seejärel iga kuu kuni sääsehooaja lõpuni. Viimane annus tuleb manustada ühe kuu vältel pärast viimast kokkupuudet sääskedega. Kui üks manustamiskord jääb vahele ja manustamisintervall on pikem kui üks kuu, vähendab kohene preparaadi manustamine ja igakuise raviskeemi taasalustamine täiskasvanud usside arenguvõimalusi. Ühe südameusstõve ennetava preparaadi asendamisel teisega tuleb esimene annus manustada ühe kuu jooksul pärast eelmise ravimi viimase annuse manustamist.

#### **Ümarusside põhjustatud parasitooside ravi (kass ja koer)**

Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

#### **Täiinfestatsiooni ravi (kass ja koer)**

Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

#### **Kuulmelestade põhjustatud parasitoosi ravi (kass)**

Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

#### **Kuulmelestade põhjustatud parasitoosi ravi (koer)**

Manustatakse üks annus veterinaarravimit. Enne iga ravimi manustamist tuleb lahtine mustus välisest kuulmekäigust õrnalt eemaldada. 30 päeva pärast ravi on soovitatav teha uus veterinaarne läbivaatus, sest mõned loomad võivad vajada teistkordset ravi.


#### **Soole nugiusside põhjustatud parasitoosi ravi (kass)**

Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

#### **Süüdiklesta põhjustatud parasitoosi ravi (koer)**

Lestade täielikuks hävitamiseks manustatakse üks annus veterinaarravimit kahel järjestikusel kuul.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS**



Võtke pipett kaitsvast pakendist välja.

1. Hoides pipetti püstises asendis, eemaldage sellelt kork. Keerake kork tagurpidi ja asetage ülemine ots allpool uuesti aplikaatori otsale. Suruge korki allapoole aplikaatori kaitsme purunemiseni.
2. Eemaldage kork vahetult enne ravimi manustamist.
3. Suruge karv looma kaela alumises osas abaluude ees lahku ja paljastage nahk.

Asetage pipeti tipp otse vastu nahka. Ärge masseerige. Pigistage pipetti tugevasti, tühjendades selle sisu ühte punkti. Vältige ravimi sattumist sõrmedele.

## 10. KEELUAEG

Ei rakendata.

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida kinnises originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pipetil, ümbrisel ja kartongkarbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

## 12. ERIHOIATUSED

### Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Loomade pesemine kaks tundi pärast preparaadi manustamist ei vähenda selle efektiivsust.

Mitte manustada märja karvastikuga loomadele. Siiski ei vähenda looma vee või šampooniga pesemine 2 tundi või rohkem pärast veterinaarravimi manustamist selle efektiivsust.

Kuulmelestadest põhjustatud parasitoosi raviks mitte manustada otse kuulmekäiku.

### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Veterinaarravim on mõeldud ainult naha pinnale manustamiseks. Mitte manustada suukaudselt või parenteraalselt.

Hoida ravitud loomi vähemalt 30 minutit pärast preparaadi manustamist või karvastiku kuivamiseni eemal lahtisest tulest või teistest süüteallikatest.

Preparaadi äralakkumise vältimiseks on tähtis manustada ravimit täpselt juhendi järgi. Kassidel võib pärast veterinaarravimi lakkumist esineda harva lühike hüpersalivatsiooni periood.

#### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Veterinaarravim on kergsüttiv: hoida eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest tulest ja teistest süüteallikatest.

Ärge suitsetage, sööge ega jooge ravimi käsitlemise ajal.

Ravim võib põhjustada naha ja silmade ärritust. Kohe pärast veterinaarravimi kasutamist peske käed ja ravimiga kokkupuutunud nahk põhjalikult seebi ning veega. Preparaadi juhuslikul sattumisel silma loputada silmi kohe veega ja pöörduda viivitamatult arsti poole ning näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Vältida otsest kokkupuudet ravitud loomadega kuni manustamiskoha kuivamiseni. Ravimise päeval ei tohi lapsed ravitud loomi katsuda ning loomadel ei tohi lubada magada omanikega, eriti koos lastega. Kasutatud pakendid tuleb kohe ära visata ja mitte jätta lastele kättesaadavasse või nähtavasse kohta. Tundliku nahaga või seda tüüpi preparaatide suhtes teadaoleva allergiaga inimesed peavad preparaati käsitlema ettevaatlikult.

#### Muud ettevaatusabinõud

Ravitud loomi ei tohi lubada veekogudesse kuni kaks tundi pärast preparaadi manustamist.

#### Tiinus ja laktatsioon

Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel kassidel ning koertel.

#### Sigivus

Lubatud kasutada aretuses kasutatavatel kassidel ja koertel.

#### Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

#### Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Selamektiini kümnekordse soovitatava annuse manustamise järel ei täheldatud soovimatuid toimeid. Selamektiini manustamisel täiskasvanud südameussidega nakatunud kassidele ja koertele kolmekordses soovitatavas annuses kõrvatoimeid ei esinenud. Selamektiini manustamisel kolmekordses soovitatavas annuses aretuses kasutatavatele isastele ja emastele koertele ning kassidele, sealhulgas tiinetele ja lakteerivatele, järglasi imetavatele emasloomadele, ja viiekordses annuses ivermektiini suhtes tundlikele kollidele, kõrvaltoimeid ei esinenud.

### **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu.

Selamektiin võib olla ohtlik kaladele ja nende toiduks olevatele veeorganismidele.

Pakendid ja jäätmematerjal tuleb veekogudesse sattumise vältimiseks hävitada koos kodumajapidamises tekkivate jäätmetega.

### **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt (<http://www.ema.europa.eu>).

### **15. LISAINFO**

Ravim on müügil 1, 4 ja 24 pipetti sisaldavate pakenditena (kõik pipeti suurused). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

**België/Belgique/Belgien**

VIRBAC BELGIUM NV  
Esperantolaan 4  
BE-3001 Leuven  
Tél/Tel : +32-(0)16 387 260

Tel: 32 (0) 10 47 06 35

**Република България**

VIRBAC S.A.  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Франция  
Тел: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Česká republika**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Francie  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Danmark**

VIRBAC Danmark A/S  
Profilvej 1  
DK-6000 Kolding  
Tlf: +45 75521244  
T

**Deutschland**

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH  
Rögen 20  
DE-23843 Bad Oldesloe  
Tel: 49 (4531) 805 111

**Eesti**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Prantsusmaa  
Tel: +33-(0)4 92 08 73 00  
E-mail:

**Ελλάδα**

VIRBAC HELLAS A.E.  
13<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  
EL-14452, Μεταμόρφωση  
ηλ:Tel: +30 210 6219520  
E-mail: [info@virbac.gr](mailto:info@virbac.gr)

**Lietuva**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Prancūzija  
Tel: +33-(0)4 92 08 73 00  
T

**Luxembourg/Luxemburg**

VIRBAC BELGIUM NV  
Esperantolaan 4  
BE-3001 Leuven  
Belgique / Belgien  
Tél/Tel: +32-(0)16 387 260

**Magyarország**

VIRBAC HUNGARY KFT  
Szent István krt.11.II/21.  
HU-1055 Budapest  
Tel: +36703387177  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Malta**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Franza  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Nederland**

VIRBAC NEDERLAND BV  
Hermesweg 15  
NL-3771 ND-Barneveld  
Tel: 31 (0) 342 427 127

**Norge**

VIRBAC Danmark A/S  
Profilvej 1  
DK-6000 Kolding  
Tel: + 45 75521244  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Österreich**

VIRBAC Österreich GmbH  
Hildebrandgasse 27  
A-1180 Wien  
Tel: 43 (0) 1 21 834 260

**España**

VIRBAC ESPAÑA, S.A.  
Angel Guimerá 179-181  
ES-08950 - Esplugues de Llobregat  
(Barcelona)  
Tel: + 34 (0) 93 470 79 40

**France**

VIRBAC  
13<sup>ème</sup> rue LID  
FR-06517 Carros  
Tél : +33-(0)805 05 55 55

**Hrvatska**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Francuska  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Ireland**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
France  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Ísland**

VIRBAC S.A.  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Frakkland  
Simi: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Italia**

VIRBAC SRL  
Via Ettore Bugatti, 15  
IT-20142 Milano  
Tel: +39 02 40 92 47 1

**Κύπρος**

VIRBAC HELLAS A.E.  
13<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  
EL-14452, Μεταμόρφωση  
Τηλ.: +30 2106219520  
Tel: +357 24813333

**Latvija**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Francjia

**Polska**

VIRBAC Sp. o.o.  
ul. Puławska 314  
PL 02-819 Warszawa  
Tel.: + 48 22 855 40 46

**Portugal**

VIRBAC DE Portugal LABORATÓRIOS LDA  
R.do Centro Empresarial  
Ed13-Piso 1- Esc.3  
Quinta da Beloura  
PT-2710-693 Sintra  
Tel: 00 351 219 245 020

**România**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Franța  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Slovenija**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Francija  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Slovenská republika**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Francúzsko  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Suomi/Finland**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Puh/Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Sverige**

VIRBAC Danmark A/S Filial Sverige  
c/o Incognito AB  
Box 1027  
SE-171 21 Solna  
Tel: +45 75521244  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**United Kingdom (Northern Ireland)**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065m LID  
FR-06516 Carros  
France

el: +33-(0)4 92 08 73 00E-mail:

el: + 33-(0)4 92 08 73 00Tel: 44 (0) 1359 243243