

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Karton – 20 ml, 50 ml, 100 ml und 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Linco-Spectin Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Lincomycini hydrochloridum (= *Lincomycinum* 50 mg) – *Spectinomycini sulfas* (= *Spectinomycinum* 100 mg) pro 1 ml.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine und Schafe

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Schweine: Essbare Gewebe: 12 Tage

Schafe: Essbare Gewebe: 15 Tage

Nicht bei Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ} Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V098786

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etiket – 100 ml und 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Linco-Spectin Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)*Lincomycini hydrochloridum* (= *Lincomycinum* 50 mg) – *Spectinomycini sulfas* (= *Spectinomycinum* 100 mg) pro 1 ml.**3. ZIELTIERART(EN)**

Schweine und Schafe

4. ARTEN DER ANWENDUNG

i.m.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Schweine: Essbare Gewebe: 12 Tage

Schafe: Essbare Gewebe: 15 Tage

Nicht bei Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etiket – 20 ml und 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Linco-Spectin

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Lincomycini hydrochloridum (= *Lincomycinum* 50 mg) – *Spectinomycini sulfas* (= *Spectinomycinum* 100 mg) pro 1 ml.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}